


感染性胃腸炎情報 2012 年 第 52 週 (12 月 24 日 ~ 12 月 30 日)

【お知らせ】 次週、2013 年第 1 週(12/31~1/6)の感染性胃腸炎情報は、平成 25 年 1 月 15 日(火)にホームページに掲載いたします。

- 岡山県内の患者報告数は 710 名 (定点あたり 13.15 人) であり、前週より減少しました。(54 定点医療機関報告)
- 倉敷市、備前地域、美作地域でレベル 3 が継続しています。
- 岡山県内で発生した食中毒患者から、ノロウイルス G II/4 変異株が検出されました。







※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、今年 27 週 ~ 翌年 26 週を 1 シーズンとして、グラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、3 週つづけて減少しました (定点あたり 17.11 → 13.15 人)。全ての地域で減少がみられますが、倉敷市 (17.91 人)、備前地域 (13.90 人)、美作地域 (20.33 人) では発生レベル 3 が継続しています*。



全国では医療機関や社会福祉施設でのノロウイルス等を原因とする感染性胃腸炎の集団感染が多発しており、岡山県でも発生が大変懸念される状態です。手洗いの徹底や、下痢便・吐物の適切な処理などの感染予防と拡大防止に努めてください。(※：感染性胃腸炎は、発生レベル 3 の開始基準 20.00 人を一度越えると、終息基準値 12.00 人より下がらないとレベル 3 は解除されません。)

◆地域別・年齢別発生状況



◆ ウイルス検出情報

県内で 11 月に発生した食中毒患者から検出されたノロウイルス 3 株を遺伝子解析したところ、今シーズン全国各地で検出されている G II/4 変異株 (G II/4 2012 変異株) であることが確認されました。




(国立感染症研究所HPより)

この時期の感染性胃腸炎の主な原因であるノロウイルスの感染予防は、流水・石けんによる手洗いの励行と、吐物や下痢便の適切な処理を行うことが極めて重要です。排便後や、調理・食事の前には手洗いを励行しましょう。吐物や下痢便を処理するときは、使い捨ての手袋やエプロンを使用し、処理する人自身が感染しないよう気をつけ、また、他へ感染を広げないよう気をつけましょう。消毒には塩素系漂白剤を使用し、広い範囲を消毒して下さい。

アルコールは消毒効果が低いとされています。また、拭き取りに使った布などはただちにゴミ袋に入れ密閉し、廃棄してください。[○ノロウイルスに関するQ&Aについて\(厚生労働省\)](#)

[○注意！この冬はノロウイルスに注意しましょう。\(厚生労働省\)](#)



【医療機関などの方へ】

◆ノロウイルスに関する院内感染事案の報告等に関する事務連絡が厚生労働省から発出されました。
(平成24年12月25日)

全国では、院内感染によるノロウイルスの集団感染事例や患者の死亡事案が散見されています。厚生労働省では平成24年12月25日付で、ノロウイルスに関する院内感染事案の報告等に関する事務連絡が発出され、さらなる感染予防対策に努めるよう注意喚起を行っています。


- さらなる手洗いの徹底や、糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策をお願いします。
- 院内感染によるノロウイルスの集団感染を疑う場合や、院内感染との因果関係が否定できない死亡事例が発生した場合は、速やかに管轄保健所に報告し、支援を受けるをお願いします。



岡山県地区別 感染性胃腸炎感染症マップ 2012年 52週

2013年1月7日

17:11:57



感染性胃腸炎

レベル3		レベル2	レベル1	報告なし
開始基準値	終息基準値	基準値	基準値	基準値
20	12		0 < 20 未満	0

レベル3の開始基準値を一度超えると、終息基準値より下がらないとレベル3が継続されます。