

岡山県感染症週報 2016 年 第 12 週 (3 月 21 日～3 月 27 日)

岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

◆2016 年 第 12 週 (3/21～3/27) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第 10 週 2 類感染症 結核 1 名 (90 代 男)
 5 類感染症 梅毒 1 名 (20 代 男)
 第 11 週 5 類感染症 侵袭性肺炎球菌感染症 1 名 (70 代 男)
 第 12 週 2 類感染症 結核 2 名 (70 代 男 1 名・女 1 名)
 4 類感染症 レジオネラ症 1 名 (80 代 女)
 5 類感染症 アメーバ赤痢 1 名 (30 代 男)

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

- インフルエンザは、県全体で 831 名 (定点あたり 15.56 → 9.89 人) の報告があり、前週より大きく減少しました。
 ○流行性耳下腺炎は、県全体で 70 名 (定点あたり 1.07 → 1.30 人) の報告があり、前週より増加しました。
 ○感染性胃腸炎は、県全体で 283 名 (定点あたり 6.28 → 5.24 人) の報告があり、前週より減少しました。

- インフルエンザ**は、県全体で 831 名 (定点あたり 15.56 → 9.89 人) の報告があり、前週より大きく減少しました。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき注意喚起を図っています。地域別では、真庭地域 (22.00 人)、倉敷市 (15.94 人)、備中地域 (11.08 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。全ての地域で患者の減少がみられましたが、依然として多くの患者が報告されており、真庭地域・倉敷市・備中地域では、大きな流行が継続しています。県内の発生状況など詳しくは、「インフルエンザ週報」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2015/2016 年シーズン インフルエンザ情報](#)』をご覧ください。
- 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)**は、県全体で 70 名 (定点あたり 1.07 → 1.30 人) の報告があり、前週より増加しました。例年と比較して報告数が多い状態が続いています。地域別では、備北地域 (4.75 人)、岡山市 (2.07 人)、美作地域 (1.17 人) の順で定点あたり報告数が多くなっており、特に備北地域では、前週より大きく増加 (定点あたり 0.50 → 4.75 人) し、発生レベル 2 となりました。この感染症は、予後は一般に良好ですが、まれに無菌性髄膜炎、感音性難聴、精巣炎などの合併症を引き起こすことがあり、年齢が高くなるにつれて症状が重くなる傾向があります。効果的に予防する唯一の方法は、ワクチンを接種することです。
- 感染性胃腸炎**は、県全体で 283 名 (定点あたり 6.28 → 5.24 人) の報告があり、前週より減少しました。地域別では、美作地域 (8.33 人)、備北地域 (7.25 人)、備前地域 (6.00 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など詳しくは、「感染性胃腸炎週報」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2015/2016 年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

流行の推移と発生状況

疾病名	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ		★★★	RSウイルス感染症		★★
咽頭結膜熱		★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★
感染性胃腸炎		★	水痘		★
手足口病		★	伝染性紅斑		★★
突発性発疹		★	百日咳		
ヘルパンギーナ			流行性耳下腺炎		★★★★★
急性出血性結膜炎			流行性角結膜炎		★
細菌性髄膜炎			無菌性髄膜炎		
マイコプラズマ肺炎		★	クラミジア肺炎		
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)		* 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) については、2013 年第 42 週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。			

【記号の説明】 前週からの推移： : 2 倍以上の減少 : 1.1～2 倍未満の減少 : 1.1 未満の増減

: 1.1～2 倍未満の増加 : 2 倍以上の増加

発生状況：今週の流行状況を過去 5 年間と比較し、5 段階で表示しています。

空白：発生なし ★：僅か ★★★：少し ★★★★★：やや多い ★★★★★★：多い ★★★★★★★★：非常に多い

◆ 春休みに海外へ旅行される方へ

○春休みに海外へ旅行される方に向けた感染症情報が、
厚生労働省検疫所のホームページに掲載されました。

[春休みに海外へ渡航される皆さまへ（厚生労働省検疫所）](#)

海外には、通常日本国内に存在しない感染症が多くあります。

海外で感染症にかからないようにするには、出発前にあらかじめ渡航先の感染症に関する情報を入手しておくことが大切です。

特に、中南米を中心に、ジカウイルス感染症が多数報告されていますので、妊婦及び妊娠の可能性のある方は、可能な限り流行地への渡航を控えてください。

[ジカウイルス感染症について（厚生労働省）](#)

<旅行中の注意点>

- 生水、氷、カットフルーツやサラダなど、火が通ってないものを食べることは避けましょう。
- 蚊やダニに刺されないように、注意しましょう。
（肌の露出を少なくする、虫よけ剤を使用するなど）
- 動物には、むやみに近づいたり、触らないようにしましょう。
（狂犬病や鳥インフルエンザなどのウイルスをもっていることがあります）
- 外出後は、しっかり手洗いをしましょう。

<帰国した後に>


- 帰国時に体調不良があれば、空港の検疫所に相談しましょう。
- 帰国時に症状がなくても、その後体調が悪くなったときは、
早めに医療機関を受診し、その際は必ず渡航先も伝えましょう。

インフルエンザ週報 2016 年 第 12 週 (3 月 21 日 ~ 3 月 27 日)

岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 831 名（定点あたり 9.89 人）の報告がありました。（84 定点医療機関報告）
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 7 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者 6 名の報告がありました。



インフルエンザは、県全体で 831 名（定点あたり 15.56 → 9.89 人）の報告があり、3 週連続で減少しました。県全体の報告数は、第 9 週をピークに大きく減少したものの、依然として多くの患者が報告されています。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき注意喚起を図っています。

地域別では、真庭地域（22.00 人）、倉敷市（15.94 人）、備中地域（11.08 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。全ての地域で患者の減少がみられましたが、真庭地域・倉敷市・備中地域では、大きな流行が継続しています。

現在、学校は春休み中のため、集団生活での感染の機会は減ると思われますが、人の移動が多くなることから、ひきつづき感染予防に努めてください。また症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

◆インフルエンザは、まだまだ流行しています ひきつづき感染予防に努めましょう

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度(50~60%)を保ちましょう。

【 かかったかな？という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 周りの人にうつさないように、「咳エチケット」を心がけましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。


1.地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	831		備 中	患者数	133	
	定点あたり	9.89			定点あたり	11.08	
岡山市	患者数	135		備 北	患者数	41	
	定点あたり	6.14			定点あたり	6.83	
倉敷市	患者数	255		真 庭	患者数	66	
	定点あたり	15.94			定点あたり	22.00	
備 前	患者数	119		美 作	患者数	82	
	定点あたり	7.93			定点あたり	8.20	









【記号の説明】 前週からの推移
：2倍以上の減少
：1.1～2倍未満の減少
：1.1未満の増減
：1.1～2倍未満の増加
：2倍以上の増加

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>


レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10以上 30未満
レベル1		報告なし
基準値		基準値
0< 10未満		0



全国集計第11週(3/14～3/20)速報値によると、全国の定点あたり報告数は21.13人となり、前週(28.20人)より減少しました。都道府県別では、愛媛県(35.66人)、北海道(31.79人)、高知県(30.79人)の順で定点あたり報告数が多くなっており、44都府県で前週の報告数より減少しました。

2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、4-6歳・7-9歳・10-14歳 各17%、0-3歳11%、40代8%の順で高くなっています。第12週は、幼稚園・小中学校などで集団生活をしている年齢層の占める割合が、前週より減少しました。





3. インフルエンザウイルス検出状況

第12週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、5株（詳細は下表参照）でした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、B型20株〔山形系統15株・ビクトリア系統5株〕（45%）、AH3型19株（42%）、AH1pdm09型6株（13%）となっています。

今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH1pdm09型の検出割合が最も多く57%、次いでB型が31%〔ビクトリア系統16%・山形系統15%〕、AH3型が10%の順となっています。（2016年3月25日現在）

ウイルス名	検体採取週	検体採取日	地域	年齢	性別	備考
インフルエンザウイルスAH1pdm09型	2016年第4週(1/25～1/31)	2016/1/26	備中	小学生	男	
インフルエンザウイルスB型	2016年第3週(1/18～1/24)	2016/1/22	備中	幼児	男	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第3週(1/18～1/24)	2016/1/21	備中	幼児	女	ビクトリア系統
インフルエンザウイルスB型	2016年第3週(1/18～1/24)	2016/1/20	備中	小学生	男	山形系統
インフルエンザウイルスAH3型	2016年第2週(1/11～1/17)	2016/1/16	備中	小学生	女	




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 7 施設でありました。

【第 12 週 臨時休業施設数】

▽赤磐市 2 ▽岡山市 1 ▽玉野市 1 ▽井原市 1 ▽備前市 1 ▽真庭市 1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	72	13119	61	10036	7	851	0	20	2	197	5	634	H27.11.24
岡山市	10	5048	8	3741	1	292	0	2	0	41	1	249	H27.11.24
倉敷市	0	3658	0	2811	0	224	0	6	0	18	0	200	H27.12.15
備前地域	34	1137	30	933	4	89	0	1	1	40	3	48	H27.11.24
備中地域	21	1784	16	1425	1	132	0	0	0	36	1	96	H27.11.24
備北地域	0	316	0	222	0	32	0	3	0	25	0	4	H28. 2. 3
真庭地域	7	315	7	284	1	23	0	2	1	19	0	2	H28. 2. 1
美作地域	0	861	0	620	0	59	0	6	0	18	0	35	H28.1.25

2) 臨時休業施設数の内訳

第 12 週：7 施設


累計：851 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	0	1	0	99	6	596	1	117	0	32	0	6

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、6 名（1 歳未満 1 名、5～9 歳 1 名、60～69 歳 2 名、80 歳以上 2 名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずとうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関に相談しましょう。



【第 12 週 入院患者報告数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計
入院患者数	1		1							2		2	6
ICU 入室													
人工呼吸器の利用													
頭部 CT 検査(予定含)													
頭部 MRI 検査(予定含)													
脳波検査 (予定含)													
いずれにも該当せず	1		1							2		2	6


【2015 年 8 月 31 日以降に入院した患者の累計数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計
入院患者数	5	12	11	1			1	2	5	12	12	23	84
ICU 入室 *			1						1	1	1		4
人工呼吸器の利用 *			1						1	1	1		4
頭部 CT 検査(予定含) *		4							1	3	1	5	14
頭部 MRI 検査(予定含) *		2		1						1		1	5
脳波検査 (予定含) *		1	1										2
いずれにも該当せず	5	7	10				1	2	2	8	9	18	62

* 重複あり

感染性胃腸炎週報 2016 年 第 12 週 (3 月 21 日 ~ 3 月 27 日)

○感染性胃腸炎は、県全体で 283 名（定点あたり 6.28 → 5.24 人）の報告がありました（54 定点医療機関報告）。










※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27 週～翌年 26 週でグラフを作成しています。


感染性胃腸炎は、県全体で 283 名（定点あたり 6.28 → 5.24 人）の報告があり、前週より減少しました。

冬から春にかけての感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いとされています。排便後、調理・食事の前には石けんと流水で十分に手を洗う、下痢便・おう吐物を適切に処理するなど、感染予防と拡大防止に努めてください。


◆地域別・年齢別発生状況



岡山県 感染性胃腸炎地域別発生状況



感染性胃腸炎 年齢別割合
(第12週)



地域別では、美作地域（8.33 人）、備北地域（7.25 人）、備前地域（6.00 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。第 12 週年齢別割合では、0-2 歳が前週（26%）より増加し 30%、次いで 3-5 歳 23%、6-9 歳 20% の順で高くなっています。

例年 3～5 月には、0～2 歳の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状はおう吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。おう吐や下痢により脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

[ロタウイルスに関する Q&A（厚生労働省）](#)

[ノロウイルスに関する Q&A（厚生労働省）](#)

◆◆ ノロウイルスに感染しないためには ◆◆

1. 最も大切なことは手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理するときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをします。アルコールは、ノロウイルスに対して消毒効果が低いとされています。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、**85℃で1分以上の熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウム（家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**の消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、付着した汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いした後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

※塩素系漂白剤の使用に当たっては「使用上の注意」を確認しましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を 85～90℃で 90 秒間以上）

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

保健所別報告患者数（定点把握）2016年 12週（2016/03/21～2016/03/27）

2016年3月31日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	831	9.89	135	6.14	255	15.94	119	7.93	133	11.08	41	6.83	66	22.00	82	8.20
RSウイルス感染症	9	0.17	6	0.43	3	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	5	0.09	2	0.14	1	0.09	—	—	1	0.14	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	0.80	6	0.43	20	1.82	3	0.30	6	0.86	5	1.25	—	—	3	0.50
感染性胃腸炎	283	5.24	61	4.36	56	5.09	60	6.00	19	2.71	29	7.25	8	4.00	50	8.33
水痘	16	0.30	7	0.50	8	0.73	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—
手足口病	1	0.02	1	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	13	0.24	3	0.21	2	0.18	3	0.30	—	—	—	—	3	1.50	2	0.33
突発性発疹	12	0.22	5	0.36	4	0.36	1	0.10	—	—	1	0.25	—	—	1	0.17
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	70	1.30	29	2.07	9	0.82	5	0.50	1	0.14	19	4.75	—	—	7	1.17
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	1	0.08	—	—	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	2	0.40	—	—	2	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（－： 0 or 0.00） （空白： 定点なし）

保健所別報告患者数（発生レベル設定疾患）2016年 12週 （ 2016/03/21～2016/03/27 ）

2016年3月31日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	831	9.89	135	6.14	255	15.94	119	7.93	133	11.08	41	6.83	66	22.00	82	8.20
咽頭結膜熱	5	0.09	2	0.14	1	0.09	—	—	1	0.14	—	—	—	—	1	0.17
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	0.80	6	0.43	20	1.82	3	0.30	6	0.86	5	1.25	—	—	3	0.50
感染性胃腸炎	283	5.24	61	4.36	56	5.09	60	6.00	19	2.71	29	7.25	8	4.00	50	8.33
水痘	16	0.30	7	0.50	8	0.73	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—
手足口病	1	0.02	1	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	13	0.24	3	0.21	2	0.18	3	0.30	—	—	—	—	3	1.50	2	0.33
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	70	1.30	29	2.07	9	0.82	5	0.50	1	0.14	19	4.75	—	—	7	1.17
急性出血性結膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	1	0.08	—	—	—	—	—	—	1	1.00	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字

は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3

薄黄セルに黒数字

は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2016年 第12週 2016/03/21～2016/03/27)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	831	3	16	23	27	35	33	47	38	29	26	36	98	35	51	77	79	71	57	29	21

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	9	1	1	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	5	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	43	-	-	-	3	4	8	4	5	4	2	1	8	-	4
感染性胃腸炎	283	7	22	29	25	23	18	25	14	20	11	12	22	6	49
水痘	16	-	1	2	-	-	2	4	2	2	1	1	-	1	-
手足口病	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	13	-	-	2	-	2	1	2	1	1	1	3	-	-	-
突発性発疹	12	-	4	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	70	-	-	3	8	10	15	7	11	5	3	1	4	1	2

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-





疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)


全数把握 感染症患者発生状況

2016 年 12 週


分類	疾病名	2016		2015	疾病名	2016		2015	疾病名	2016		2015
		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年		今週	累計	昨年
一類	エボラ出血熱	-	-	-	クリミア・コンゴ出血熱	-	-	-	痘そう	-	-	-
	南米出血熱	-	-	-	ペスト	-	-	-	マールブルグ病	-	-	-
	ラッサ熱	-	-	-		-	-	-		-	-	-
二類	急性灰白髄炎	-	-	-	結核	2	65	373	ジフテリア	-	-	-
	重症急性呼吸器症候群	-	-	-	中東呼吸器症候群	-	-	-	鳥インフルエンザ(H5N1)	-	-	-
	鳥インフルエンザ(H7N9)	-	-	-		-	-	-		-	-	-
三類	コレラ	-	-	-	細菌性赤痢	-	-	2	腸管出血性大腸菌感染症	-	2	63
	腸チフス	-	-	-	パラチフス	-	-	-		-	-	-
四類	E型肝炎	-	-	3	ウエストナイル熱	-	-	-	A型肝炎	-	2	9
	エキノコックス症	-	-	-	黄熱	-	-	-	オウム病	-	-	1
	オムスク出血熱	-	-	-	回帰熱	-	-	-	キャサヌル森林病	-	-	-
	Q熱	-	-	-	狂犬病	-	-	-	コクシジオイデス症	-	-	-
	サル痘	-	-	-	ジカウイルス感染症	-	-	-	重症熱性血小板減少症候群	-	-	-
	腎症候性出血熱	-	-	-	西部ウマ脳炎	-	-	-	ダニ媒介脳炎	-	-	-
	炭疽	-	-	-	チクングニア熱	-	-	-	つつが虫病	-	-	1
	デング熱	-	-	2	東部ウマ脳炎	-	-	-	鳥インフルエンザ	-	-	-
	ニパウイルス感染症	-	-	-	日本脳炎	-	-	-	日本紅斑熱	-	-	3
	ハンタウイルス肺症候群	-	-	-	Bウイルス病	-	-	-	鼻疽	-	-	-
	ブルセラ症	-	-	-	ベネズエラウマ脳炎	-	-	-	ヘンドラウイルス感染症	-	-	-
	発しんチフス	-	-	-	ボツリヌス症	-	-	-	マラリア	-	-	2
	野兎病	-	-	-	ライム病	-	-	-	リッサウイルス感染症	-	-	-
	リフトバレー熱	-	-	-	類鼻疽	-	-	-	レジオネラ症	1	6	28
	レプトスピラ症	-	-	-	ロッキー山紅斑熱	-	-	-		-	-	-
五類	アメーバ赤痢	1	1	17	ウイルス性肝炎*3	-	1	9	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染	-	2	34
	急性脳炎*4	-	3	14	クリプトスポリジウム症	-	-	1	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	-	1	2	後天性免疫不全症候群	-	1	21	ジアルジア症	-	1	4
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	-	1	2	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	侵襲性肺炎球菌感染症	-	10	35
	水痘(入院例に限る。)	-	-	6	先天性風しん症候群	-	-	-	梅毒	-	7	25
	播種性クリプトコックス症	-	1	1	破傷風	-	-	-	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染	-	-	-
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	風しん	-	-	-	麻しん	-	-	-
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-		-	-	-		-	-	-




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髓膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

