

岡山県感染症週報 2017年 第10週 (3月6日～3月12日)

岡山県は『インフルエンザ警報』を発令中です

◆2017年 第10週(3/6～3/12)の感染症発生動向(届出数)

■全数把握感染症の発生状況

第8週 2類感染症 結核 2名(60代 男)

第9週 2類感染症 結核 2名(30代 男 1名、80代 男 1名)

5類感染症 ウイルス性肝炎 1名(30代 男)

急性脳炎 1名(乳児 女)

第10週 2類感染症 結核 6名(20代 女 1名、60代 女 1名、70代 男 1名・女 2名、

80代 男 1名)

5類感染症 急性脳炎 1名(10代 男)

■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数：インフルエンザ定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

○インフルエンザは、県全体で 837 名(定点あたり 12.96 → 9.96 人)の報告があり、前週より減少しました。

○急性出血性結膜炎は、県全体で 6 名(定点あたり 0.00 → 0.50 人)の報告があり、前週より大きく増加しました。

○感染性胃腸炎は、県全体で 208 名(定点あたり 3.56 → 3.85 人)の報告があり、前週とほぼ同数でした。

【第11週 速報】

○インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 6 施設でありました。(3月13日～3月14日)

1. **インフルエンザ**は、県全体で 837 名(定点あたり 12.96 → 9.96 人)の報告があり、前週より減少しました。第 4 週(1/23～1/29)をピークに患者数は減少していますが、依然として多くの患者が報告されています。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき広く注意を呼びかけています。地域別では、備中地域(16.33 人)、倉敷市(15.13 人)、美作地域(11.70 人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など詳しくは、「[インフルエンザ週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2016/2017 年シーズン インフルエンザ情報「インフルエンザ警報」発令中!](#)』をご覧ください。
2. **急性出血性結膜炎**は、県全体で 6 名(定点あたり 0.00 → 0.50 人)の報告があり、前週より大きく増加しました。2016 年の年間患者報告数は 7 名であり、散発的に報告されていましたが、第 10 週は 1 週間で 6 名と、集中的に報告されています。地域別では、岡山市(1.20 人)のみで患者が報告されており、発生レベル 3 となっています。この感染症は、エンテロウイルス 70 型やコクサッキーウイルス A24 変異型などに感染することで起こる急性結膜炎です。潜伏期は 1 日で、症状は、強い眼の痛み、異物感、羞明(光を異常にまぶしがる)などで始まり、結膜の充血、特に結膜下出血を伴うことが多いです。全身症状として、頭痛、発熱、呼吸器症状などが現れることもあります。ウイルスに対する治療薬はなく、対症療法が中心となります。このウイルスは、感染力が強く、人と接触する機会の多い家庭や職場、病院などで流行します。感染した際には、眼を触らないよう気を付け、触ったら石鹸と流水でよく手を洗う、タオルや洗面器などの共用は避ける、家庭内での入浴は最後にするなど、感染予防と拡大防止に努めましょう。
3. **感染性胃腸炎**は、県全体で 208 名(定点あたり 3.56 → 3.85 人)の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、美作地域(5.67 人)、真庭地域(4.50 人)、倉敷市(4.18 人)の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など詳しくは、「[感染性胃腸炎週報](#)」及び岡山県感染症情報センターホームページ『[2016/2017 年 感染性胃腸炎情報](#)』をご覧ください。

小学校入学前に、麻しん・風しんの予防接種を！

* 麻しん・風しんの定期予防接種(第2期)の接種期間は、

小学校入学前の1年間(4月1日～3月31日)となっています。

平成29年4月から小学校に入学されるお子さんが、まだ接種を済ませていない場合は、積極的な接種をご検討ください。

接種対象者：平成22年4月2日～平成23年4月1日生まれの方

[お子さんの風しんワクチンは2回。\(厚生労働省\)](#)

流行の推移と発生状況

	推移	発生状況	疾病名	推移	発生状況
インフルエンザ		★★★	RSウイルス感染症		★
咽頭結膜熱		★★	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		★★
感染性胃腸炎		★★	水痘		★
手足口病		★	伝染性紅斑		★
突発性発疹		★★	百日咳		
ヘルパンギーナ		★	流行性耳下腺炎		★
急性出血性結膜炎		★★★★★	流行性角結膜炎		★
細菌性髄膜炎			無菌性髄膜炎		
マイコプラズマ肺炎			クラミジア肺炎		
感染性胃腸炎(ロタウイルス)		* 感染性胃腸炎(ロタウイルス)については、2013年第42週から報告対象となったため、前週からの推移のみ表示しています。			

【記号の説明】 前週からの推移： ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：大幅な減少 ：減少
 大幅：前週比100%以上の増減 増加・減少：前週比10～100%未満の増減

発生状況：今週の流行状況を過去5年間と比較し、5段階で表示しています。（発生数が多いことを示すものではありません。）
 空白：発生なし ★：わずか ★★：少し ★★★：やや多い ★★★★：多い ★★★★★：非常に多い

春休みに海外へ渡航される方に向けた感染症情報が、厚生労働省のホームページに掲載されています。

海外には、通常日本国内に存在しない感染症が多くあります。
 海外で感染症にかからないようにするには、出発前にあらかじめ渡航先の感染症に関する情報を入手しておくことが大切です。

旅行中の注意

- ・生水、氷、カットフルーツ、サラダ、ラクダの乳など、火が通っていないものを食べることは避けましょう。
- ・蚊・ダニに刺されないように、注意しましょう。
 （肌の露出を少なくする、虫よけ剤を使用するなど）
- ・動物には、むやみに近づいたり、触らないようにしましょう。
 （狂犬病、鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群（MERS）などのウイルスをもっていることがあります）
- ・外出後は、しっかり手洗いをしましょう。

帰国した後

- ・帰国時に発熱や下痢などの症状がある方は、空港の検疫所に相談しましょう。
- ・帰国時に症状がなくても、その後体調が悪くなったときは、早めに医療機関を受診し、その際は必ず渡航先も伝えましょう。

春休みに海外へ渡航される皆さまへ！ （厚生労働省検疫所）

インフルエンザ週報 2017年 第10週 (3月6日～3月12日)


岡山県は『インフルエンザ警報』発令中です

➤ 岡山県の流行状況

- インフルエンザは、県全体で 837 名（定点あたり 9.96 人）の報告がありました（84 定点医療機関報告）。
- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 18 施設でありました。
- インフルエンザによる入院患者 5 名の報告がありました。

【第 11 週 速報】

- インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 6 施設でありました。（3月13日～3月14日）



※ インフルエンザは、通常、秋から翌年の春にかけて流行するため、第27週～翌年第26週で、グラフを作成しています。

インフルエンザは、県全体で 837 名（定点あたり 12.96 → 9.96 人）の報告があり、前週より減少しました。第4週（1/23～1/29）をピークに患者数は減少していますが、依然として多くの患者が報告されています。岡山県は、『インフルエンザ警報』発令中であり、ひきつづき広く注意を呼びかけています。

地域別では、備中地域（16.33 人）、倉敷市（15.13 人）、美作地域（11.70 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。多くの地域で患者の減少がみられましたが、備中地域と倉敷市では、大きな流行が継続しています。

第10週の学校等の臨時休業は、18施設から報告がありました。前週（44施設）より減少しているものの、第11週速報でも、すでに臨時休業をしている施設がありますので、ひきつづき幼稚園・小学校・中学校を中心とした集団の中での感染に注意してください。

『外出後や食事前の手洗いを徹底する』『人混みでは、マスクを着用する』『十分な睡眠をとる』など、感染予防に努めましょう。また、症状のある方は早めに医療機関を受診するとともに、マスクを着用するなど咳エチケットを心がけましょう。

[インフルエンザ Q&A（厚生労働省）](#)

[平成28年度 今冬のインフルエンザ総合対策について\(厚生労働省\)](#)

◆インフルエンザは流行が継続しています。 ひきつづき感染予防に努めましょう。

【 予 防 】

- * 外出後は手洗いをしましょう。アルコールを含んだ消毒剤で手を消毒するのも効果的です。
- * 人混みでは、マスクを着用しましょう。
- * 十分な睡眠をとり、バランスの良い食事を心がけて、抵抗力をつけましょう。
- * 室内では加湿器を使うなど、適度な湿度（50～60％）を保ちましょう。

【 かかったかな？ という時には 】

- * 早めに医療機関を受診しましょう。
- * 水分を十分にとり、安静にして休養をとりましょう。
- * 周りの人にうつさないように、『咳エチケット』を心がけましょう。


1. 地域別発生状況

前週からの推移（単位：人）

地域名	発生状況		推移	地域名	発生状況		推移
岡山県全体	患者数	837	▲	備 中	患者数	196	▶
	定点あたり	9.96			定点あたり	16.33	
岡山市	患者数	152	▲	備 北	患者数	52	▶
	定点あたり	6.91			定点あたり	8.67	
倉敷市	患者数	242	▲	真 庭	患者数	29	▼
	定点あたり	15.13			定点あたり	9.67	
備 前	患者数	49	▲	美 作	患者数	117	▶
	定点あたり	3.27			定点あたり	11.70	









【記号の説明】 前週からの推移 ▲：大幅な増加 ▲：増加 ▶：ほぼ増減なし ▼：大幅な減少 ▼：減少
 大幅：前週比 100%以上の増減 増加・減少：前週比 10～100%未満の増減

インフルエンザ感染症マップ



<インフルエンザ発生レベル 基準>

レベル3		レベル2
開始基準値	終息基準値	基準値
30	10	10 以上 30 未満
レベル1		報告なし
基準値	基準値	基準値
0 < 10 未満		0




全国集計第9週（2/27～3/5）速報値によると、全国の定点あたり報告数は13.55人となり、前週（16.87人）より減少しました。都道府県別では、長崎県（21.39人）、石川県（20.96人）、沖縄県（20.43人）の順で定点あたり報告数が多くなっており、2道県（北海道・山形県）で前週の報告数よりも増加がみられました。

[インフルエンザの発生状況について](#)
 （厚生労働省）


2. 年齢別発生状況

今シーズンの年齢別累計割合は、10-14歳 15%、4-6歳 14%、7-9歳 12%の順で高くなっています。




3. インフルエンザウイルス検出状況

第10週、環境保健センターで判明したインフルエンザウイルスは、ありませんでした。今シーズン、これまでに環境保健センターで検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 65株 (90%)、B型 (ビクトリア系統) 4株 (6%)、AH1pdm09型 2株 (3%)、A型 (亜型不明) 1株 (1%) となっています。



今シーズン、全国で検出されたインフルエンザウイルスは、AH3型 92%、AH1pdm09型 3%、B型 4% [ビクトリア系統 2%・山形系統 2%] の順となっています。

(2017年3月10日現在)




4. インフルエンザ様疾患による学校等の臨時休業施設数

インフルエンザによるとみられる学校等の臨時休業が 18 施設でありました。

【第 10 週 臨時休業施設数】

▽倉敷市	7	▽岡山市	2	▽笠岡市	2	▽真庭市	2
▽久米南町	2	▽高梁市	1	▽瀬戸内市	1	▽鏡野町	1



1) 有症者数・欠席者数および臨時休業措置の内訳

地域名*	有症者数		うち欠席者数		施設数合計		休園・休校数		学年閉鎖施設数		学級閉鎖施設数		初発年月日
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	
岡山県全体	187	12187	139	9230	18	808	2	13	7	197	9	598	H28.11.2
岡山市	28	4465	17	3306	2	276	0	4	1	31	1	241	H28.12.12
倉敷市	82	3139	64	2444	7	200	—	—	1	22	6	178	H28.11.29
備前地域	6	1555	5	1235	1	112	0	1	1	41	0	70	H28.12.12
備中地域	18	1440	16	1077	2	97	0	1	0	39	2	57	H28.11.2
備北地域	7	570	4	391	1	42	0	4	1	21	0	17	H28.11.21
真庭地域	5	150	3	120	1	18	—	—	1	12	0	6	H29.1.16
美作地域	41	868	30	657	4	63	2	3	2	31	0	29	H28.11.16

* 地域名は、保健所管轄地域を表しています。

2) 臨時休業施設数の内訳



第 10 週 : 18 施設 累計 : 808 施設

	保育所		幼稚園		小学校		中学校		高等学校		その他	
	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計	今週	累計
施設数	—	—	3	88	12	468	3	160	0	77	0	15

5. インフルエンザによる入院患者報告数（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

インフルエンザによる入院患者は、5 名（1～4 歳 3 名、5～9 歳 1 名、70～79 歳 1 名）の報告がありました。

幼児や高齢者、慢性疾患・代謝疾患をもつ人、免疫機能が低下している人などでは重症化することがありますので、注意が必要です。幼児ではまれに脳炎を起こすことがあります。水分をとった後すぐ吐いてしまう、元気がない、意識がはっきりせずうとうとしている、けいれんを起こす、このような症状がみられるときは、すぐに医療機関を受診しましょう。



【第 10 週 入院患者報告数】

年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計*
入院患者数		3	1								1		5
ICU 入室 *													
人工呼吸器の利用 *													
頭部 CT 検査(予定含) *		1											1
頭部 MRI 検査(予定含) *		1											1
脳波検査 (予定含) *													
いずれにも該当せず		2	1								1		4

* 重複あり

【2016 年 9 月 5 日以降に入院した患者の累計数】


年齢	1 歳未満	1～4 歳	5～9 歳	10～14 歳	15～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳	50～59 歳	60～69 歳	70～79 歳	80 歳以上	計*
入院患者数	4	18	8	3	1		1	3	1	7	16	36	98
ICU 入室 *			1								1	1	3
人工呼吸器の利用 *													
頭部 CT 検査(予定含) *		1	2					1		1	4	12	21
頭部 MRI 検査(予定含) *		3	2								1	1	7
脳波検査 (予定含) *		1	1										2
いずれにも該当せず	4	14	6	3	1		1	2	1	6	12	24	74

* 重複あり

感染性胃腸炎週報 2017年 第10週 (3月6日～3月12日)

岡山県の流行状況

○感染性胃腸炎は、県全体で208名（定点あたり3.85人）の報告がありました（54定点医療機関報告）。












※感染性胃腸炎は秋から翌年の春にかけて流行するため、27週～翌年26週でグラフを作成しています。

感染性胃腸炎は、県全体で208名（定点あたり3.56→3.85人）の報告があり、前週とほぼ同数でした。地域別では、美作地域（5.67人）、真庭地域（4.50人）、倉敷市（4.18人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

冬の感染性胃腸炎の原因は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスによるものが多いとされています。手洗いの徹底や、下痢便・おう吐物の適切な処理など、感染予防と拡大防止に努めてください。

◆地域別・年齢別発生状況





2017年第10週までの年齢別累計割合では、5歳以下の乳幼児が全体の56%を占めており、週別年齢別割合をみると、第7週（2/13～2/19）以降、0～2歳の割合が徐々に高くなっています。

例年3～5月には、2歳以下の乳幼児を中心にロタウイルスによる胃腸炎が増加するとされています。主な症状はおう吐と下痢で、ノロウイルスによる胃腸炎に比べ重症度が高いといわれています。おう吐や下痢により脱水症状を起こすこともありますので、体調の変化に注意し、早めに医療機関を受診してください。

[ロタウイルスに関するQ&A（厚生労働省）](#)

◆◆ ノロウイルスによる感染性胃腸炎に気をつけましょう ◆◆

予 防 方 法

1. 最も大切なことは、手を洗うことです。

排便後や、調理・食事の前には、石けんと流水で十分に手を洗いましょう。

2. 処理をする人自身が感染しないように気をつけましょう。

おう吐物や下痢便にはウイルスが大量に含まれています。処理をするときは、使い捨ての上着や、マスク、手袋を着用し、下痢便、おう吐物をペーパータオル等で静かに拭き取りましょう。拭き取った後は、**次亜塩素酸ナトリウム（※家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**で浸すように床を拭き取り、その後水拭きをしましょう。また、処理をした後はしっかりと流水で手を洗いましょう。

3. おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、85℃で1分間以上の熱水洗濯か**次亜塩素酸ナトリウム（※家庭用塩素系漂白剤でも代用可）**での消毒が有効です。

おう吐物や下痢便で汚れた衣類は、ウイルスが飛び散らないように汚物を除去し、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いした後、熱水洗濯か次亜塩素酸ナトリウムで消毒をしましょう。

4. 食品は、中心部まで十分に加熱しましょう。（中心部を85～90℃で90秒間以上）

二枚貝の生食を控えましょう。中心部までしっかり加熱すれば安心です。

※塩素系漂白剤を使用する際には、「使用上の注意」を確認しましょう。

[ノロウイルスに関するQ&A（厚生労働省）](#)

[ノロウイルス感染症とその対応・予防（家庭等一般の方々へ）（国立感染症研究所）](#)

保健所別報告患者数 2017年 10週(定点把握)

(2017/03/06～2017/03/12)

2017年3月16日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	837	9.96	152	6.91	242	15.13	49	3.27	196	16.33	52	8.67	29	9.67	117	11.70
RSウイルス感染症	7	0.13	1	0.07	2	0.18	1	0.10	3	0.43	—	—	—	—	—	—
咽頭結膜熱	31	0.57	7	0.50	5	0.45	—	—	5	0.71	1	0.25	3	1.50	10	1.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	64	1.19	7	0.50	19	1.73	14	1.40	11	1.57	—	—	1	0.50	12	2.00
感染性胃腸炎	208	3.85	51	3.64	46	4.18	33	3.30	20	2.86	15	3.75	9	4.50	34	5.67
水痘	7	0.13	1	0.07	—	—	1	0.10	1	0.14	3	0.75	1	0.50	—	—
手足口病	20	0.37	11	0.79	5	0.45	4	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	4	0.07	1	0.07	2	0.18	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—
突発性発疹	21	0.39	8	0.57	5	0.45	1	0.10	1	0.14	2	0.50	—	—	4	0.67
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	4	0.07	3	0.21	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	21	0.39	5	0.36	14	1.27	—	—	—	—	—	—	1	0.50	1	0.17
急性出血性結膜炎	6	0.50	6	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	4	0.33	1	0.20	3	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無菌性髄膜炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マイコプラズマ肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クラミジア肺炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(- : 0 or 0.00) (空白 : 定点なし)

保健所別報告患者数 2017年 10週(発生レベル設定疾患)

(2017/03/06～2017/03/12)

2017年3月16日

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	837	9.96	152	6.91	242	15.13	49	3.27	196	16.33	52	8.67	29	9.67	117	11.70
咽頭結膜熱	31	0.57	7	0.50	5	0.45	—	—	5	0.71	1	0.25	3	1.50	10	1.67
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	64	1.19	7	0.50	19	1.73	14	1.40	11	1.57	—	—	1	0.50	12	2.00
感染性胃腸炎	208	3.85	51	3.64	46	4.18	33	3.30	20	2.86	15	3.75	9	4.50	34	5.67
水痘	7	0.13	1	0.07	—	—	1	0.10	1	0.14	3	0.75	1	0.50	—	—
手足口病	20	0.37	11	0.79	5	0.45	4	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—
伝染性紅斑	4	0.07	1	0.07	2	0.18	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヘルパンギーナ	4	0.07	3	0.21	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性耳下腺炎	21	0.39	5	0.36	14	1.27	—	—	—	—	—	—	1	0.50	1	0.17
急性出血性結膜炎	6	0.50	6	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流行性角結膜炎	4	0.33	1	0.20	3	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2

を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2017年 第10週 2017/03/06～2017/03/12)

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	837	3	9	39	32	37	34	51	52	33	19	30	107	44	58	79	67	36	36	31	40

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	7	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	31	-	-	5	6	7	2	4	1	3	-	-	3	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	64	-	-	2	4	3	9	6	6	9	8	5	11	-	1
感染性胃腸炎	208	3	11	30	21	18	17	14	8	9	10	8	30	5	24
水痘	7	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-
手足口病	20	-	-	8	7	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	4	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	21	-	12	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	21	-	-	1	3	3	3	6	1	-	-	2	1	-	1

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-





疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)


全数把握 感染症患者発生状況

2017 年 10 週


分類	疾病名	2017			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
		今週	累計	昨年		今週	累計	今週	累計	今週	累計
一類	エボラ出血熱	－	－	－	クリミア・コンゴ出血熱 ペスト	－	－	－	痘そう マールブルグ病	－	－
	南米出血熱	－	－	－		－	－	－		－	－
	ラッサ熱	－	－	－		－	－	－		－	－
二類	急性灰白髄炎	－	－	－	結核 中東呼吸器症候群	6	71	311	ジフテリア 鳥インフルエンザ(H5N1)	－	－
	重症急性呼吸器症候群	－	－	－		－	－	－		－	－
	鳥インフルエンザ(H7N9)	－	－	－		－	－	－		－	－
三類	コレラ	－	－	－	細菌性赤痢 パラチフス	－	－	－	腸管出血性大腸菌感染症	－	2
	腸チフス	－	－	－		－	－	－		－	65
四類	E型肝炎	－	1	2	ウエストナイル熱 黄熱 回帰熱 狂犬病 ジカウイルス感染症 西部ウマ脳炎 チクングニア熱 東部ウマ脳炎 日本脳炎 Bウイルス病 ベネズエラウマ脳炎 ボツリヌス症 ライム病 類鼻疽 ロッキーマウンテン紅斑熱	－	－	－	A型肝炎 オウム病 キャサヌル森林病 コクシジオイデス症 重症熱性血小板減少症候群 ダニ媒介脳炎 つつが虫病 鳥インフルエンザ 日本紅斑熱 鼻疽 ヘンドラウイルス感染症 マラリア リッサウイルス感染症 レジオネラ症	－	－
	エキノコックス症	－	－	－		－	－	－		－	3
	オムスク出血熱	－	－	－		－	－	－		－	－
	Q熱	－	－	－		－	－	－		－	－
	サル痘	－	－	－		－	－	－		－	－
	腎症候性出血熱	－	－	－		－	－	－		－	1
	炭疽	－	－	－		－	－	－		－	－
	デング熱	－	－	1		－	－	－		－	2
	ニパウイルス感染症	－	－	－		－	－	1		－	－
	ハンタウイルス肺症候群	－	－	－		－	－	－		－	4
	ブルセラ症	－	－	－		－	－	－		－	－
	発しんチフス	－	－	－		－	－	－		－	－
	野兎病	－	－	－		－	－	－		－	－
	リフトバレー熱	－	－	－		－	－	－		－	26
	レプトスピラ症	－	－	－		－	－	－		－	－
五類	アメーバ赤痢	－	4	18	ウイルス性肝炎*3 クリプトスポリジウム症 後天性免疫不全症候群 侵襲性髄膜炎菌感染症 先天性風しん症候群 破傷風 風しん	－	3	4	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染 クロイツフェルト・ヤコブ病 ジアルジア症 侵襲性肺炎球菌感染症 梅毒 バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染 麻しん	－	2
	急性脳炎*4	1	3	11		－	－	－		－	28
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	－	1	8		－	3	12		－	3
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	－	－	7		－	－	－		－	1
	水痘(入院例に限る。)	－	1	3		－	－	－		－	7
	播種性クリプトコックス症	－	－	2		－	－	4		11	32
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	－	2	1		－	－	－		40	－
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	－	－	－		－	－	－		－	－




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発疹




百日咳




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎



感染性胃腸炎(ロタウイルス)

