

# 7月中旬に食べられる美味しい モモの新品種を育成しました



品種名	品種登録年	育成地	収穫期												
			6月			7月			8月			9月			
			中	下	上	中	下	上	中	下	上	中			
はなよめ	平成7年	山梨県		■											
さきがけはくと	平成25年	県研究所			■										
日川白鳳	昭和56年	山梨県			■										
加納岩白桃	昭和58年	山梨県				■									
白鳳	(大正14年)	神奈川県					■								
<b>岡山モモ17号</b>	<b>平成27年出願</b>	<b>県研究所</b>						■							
清水白桃	(昭和7年)	岡山県内							■						
おかやま夢白桃	平成17年	県研究所								■					
白麗	平成11年	県研究所									■				
岡山PEH7号	平成26年公表	県研究所											■		
岡山PEH8号	平成26年公表	県研究所												■	
ゴールデンピーチ	—	不明													■

※太字の品種は岡山県内で育成された品種。

県推奨品種：はなよめ、日川白鳳、加納岩白桃、白鳳、清水白桃、おかやま夢白桃、白麗、ゴールデンピーチ

7月中旬に食べられる  
「岡山モモ17号」

『岡山白桃』シリーズの収穫時期

## 開発のねらい

白くて甘い『岡山白桃』を6～9月まで連続して食べてもらうため、岡山県ではオリジナル品種の育成に取り組んでいます。『岡山白桃』シリーズの一つとして、既存品種「白鳳」と同じ7月中旬に収穫できる「岡山モモ17号」を育成しました。

## 新技術の概要

- 「岡山モモ17号」は、「清水白桃RS」の自然交配から選抜した品種で、「白鳳」とほぼ同時期の7月中～下旬に成熟します。
- 「白鳳」に比べて果皮着色しにくく、栽培中の核割れや生理的落果が少ないのが特徴です。
- 「加納岩白桃」に続いて収穫でき、果実の大きさは「白鳳」と同程度で、糖度は「白鳳」より高く、果肉が柔らかくて食味が優れています。

## 活用場面

『岡山白桃』のシリーズ化により、岡山ならではの白くて甘いモモを6～9月まで連続して消費者に届けることで、『岡山白桃』のブランド強化と、生産農家の収益性向上に役立ちます。