

추가 (3차) 접종에 사용하는 백신에 대한 안내

접종비용
무 료
(전액공비)

백신접종은 자신뿐만이 아니라,
주변 사람을 지키는 것으로 이어집니다.



◎ **접종대상** 2차 백신 접종을 완료한 18세 이상인 분

◎ **사용하는 백신**

1·2차 접종한 백신 종류와 관계없이 화이자 또는 다케다/모더나 백신을 사용합니다. 화이자 1·2차의 접종 용량이 동일하지만, 다케다 / 모더나 백신은 절반만 투여합니다.

◎ **3차 접종 필요성**

백신은 높은 발병 예방효과 등이 있지만, 감염 예방효과나 고령자의 중증화 예방효과가 시간이 지남에 따라 서서히 감소한다는 것을 시사하고 있습니다. 이에 따라 감염 확산 방지 및 중증화 예방의 차원에서 1·2차 접종을 완료한 모든 분을 대상으로 추가접종의 기회를 제공하는 것이 바람직하다고 보고 있습니다.

◎ **3차 접종 안전성과 효과**

안
정
성

화이자 및 다케다/모더나의 약사 승인에서 3차 접종 후 7일 이내의 이상반응을 1·2차 접종 후와 비교하면 어느 쪽의 백신이라도 일부 증상 발병률의 차이는 있으나, 대체로 1·2차와 같은 증상이 나타납니다.

효
과

3차 접종을 한 사람이 접종을 하지 않은 사람보다도 신종 코로나바이러스에 감염 또는 중증화 되는 사람이 적다고 보고하고 있습니다.

이스라엘에서 실시된 화이자 백신 접종 후의 정보를 모은 연구에서는 추가접종한 경우, 입원 예방효과는 93%, 중증화 예방효과는 92%, 사망에 대한 예방효과는 81%였다고 보고하고 있습니다. 심지어 더욱이 60세 이상으로 추가접종을 받은 경우에는 추가접종을 받지 않은 경우와 비교하면 감염 사례의 발생률이 11.3분의 1, 중증 사례의 발생률이 19.5분의 1이었다는 보고도 있습니다.

<3차 접종 효과>

입원예방효과	93%	중증화예방효과	92%	사망예방효과	81%
--------	-----	---------	-----	--------	-----

◎ **1차·2차와는 다른 백신을 사용하여 3차 접종을 한 경우의 안전성과 효과**

영국에서는 2차 접종으로부터 12주 이상 경과한 후에 여러가지 백신을 사용하여 3차 접종을 한 경우의 연구, 그 결과가 보고된 것입니다.

안
전
성

3차 접종 후 7일 내의 이상반응은 1·2차와 같은 백신을 접종하든지 다른 백신을 접종하든지 안전성의 면에서 허용되는 것

효
과

1·2차 접종 때 화이자 백신을 접종한 사람이 3차 때 화이자 백신을 접종한 경우와 다케다/모더나 백신(※)을 접종한 경우, 어느 쪽이라도 항체 수치가 충분히 상승한다는 점

(※) 다케다 / 모더나 백신은 3차 때 는 50 μ g접종하게 되어 있으나, 본 연구에서는 100 μ g접종한 결과가 보고되어 있습니다.

백신 조합			항체 수치
화이자	→ 화이자	→ 모더나	31.7배
화이자	→ 화이자	→ 화이자	20.0배

출전 : Atmar RL, Lyke KE, Deming ME, et al. Heterologous SARS CoV 2 Booster Vaccinations: Preliminary Report.

자주 있는 질문

Q. 다케다/모더나 백신은 이상반응이 심하다고 들었습니다만 괜찮습니까?

A. 다케다/모더나 백신으로 3차 접종은 1·2차 접종 용량의 절반입니다.

2차 접종 후와 비교하면 발열이나 피로 등의 접종 후의 증상이 적은 것으로 보고되어 있습니다.

(※) 접종 후의 증상 중에 림프절병증은 2차 보다도 3차에서 많이 볼 수 있습니다.

출전: 특례 승인에 관한 보고서

Q. 화이자와 다케다/모더나 백신의 효과에 차이가 있습니까?

A. 1·2차 접종을 화이자와 다케다/모더나 백신 어느 쪽이든 2차 접종부터 약 6개월 후에도 높은 중증화 예방효과(※)를 유지하고 있습니다.

화이자와 다케다/모더나 백신의 1·2차 접종 효과를 약 6개월 동안 비교한 관찰 연구에서는 다케다/모더나 백신 쪽이 감염 예방, 발병 예방, 중증화 예방(※)의 효과가 통계학적으로도 높았다는 보고가 있었습니다.

(※) 중증화 예방에는 입원 예방을 포함

출전: Rosenberg ES, et al. medRxiv, 2021. / Self WH, et al. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021. / Dickerman BA, et al. NEJM. December 1, 2021.

Q. 3차 접종은 어떻게 하면 받을 수 있습니까?

A. 거주지의 시정촌으로부터 3차 접종용의 접종권 등이 도착하면 백신을 받고 싶으신 의료기관이나 회장을 찾아 예약해 주세요.



Q. 1차·2차접종을 아직도 하지 않았습지만, 접종을 받을 수 있습니까?

A. 접종을 받을 수 있습니다. 국비로 받을 수 있는 기간은 현시점 2022년 9월 30일까지입니다. 이 기간 안에는 1·2차 접종이 무료이오니 희망하시는 분은 이른 시일 내에 받으십시오.

◎백신을 접종하는 데는 본인의 동의가 필요합니다.

백신을 접종할 때는 감염증 예방 효과와 이상반응 위험의 양면성에 대한 올바른 지식을 갖고, 본인의 의사에 근거하여 접종 판단을 해주시기를 바랍니다. 접종을 받는 분의 동의 없이 접종을 하는 일은 없습니다.

직장이나 주위 사람 등에게 접종을 강요하거나 접종하지 않은 사람에게 차별적인 대응을 해서는 안 됩니다.

◎예방접종 건강피해 구제제도가 있습니다.

예방접종으로 인해 건강상의 피해 (병에 걸리거나, 장애를 입거나 하는 일)가 발생하는 일이 있습니다. 극히 드문 일이긴 하지만, 불가피하게 발생한 경우를 대비한 구제제도가 마련되어 있습니다.

감염 예방 대책을
지속적으로 해
주시기를 바랍니다.



밀집장소



밀접장면



밀폐공간

「3가지 밀 (밀집·밀접·밀폐)」을 회피



마스크 착용



비누로 손씻기



손가락 소독용 알코올로
철저히 소독하기

신종 코로나 백신의 유효성·안전성 등의 상세한 정보에 대해서는 후생노동성 홈페이지「신종 코로나 백신에 대해서」의 페이지를 관람해 주십시오.

후생노동성 코로나 백신 검색



홈페이지를 관람할 수 없는 경우는 거주지의 시정촌 등에 상담해 주십시오.