

# 新型コロナウイルス感染症 に対する治療薬

「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第9.0版」等を基に作成。  
実際の処方に際しては、最新の添付文章と厚生省事務連絡を確認の上、行ってください。

# 〇抗ウイルス薬

2023年8月4日作成

商品名 (一般名)	ベクルリー点滴静注用100mg (レムデシビル)	ラゲブリオカプセル200mg (モルヌピラビル)	パキロビット®パック (ニルマトレルビル/リトナビル)	ゾコーバ錠125mg (エンシトレルビル)
用法容量	静注、1日1回 軽症～中等症Ⅰ 3日間 中等症Ⅱ～重症 5日間	内服 1日2回、5日間	内服 1日2回、5日間	内服 1日1回、5日間
投与対象	軽症～重症	18歳以上 重症化リスクを有する 軽症～中等症Ⅰ	12歳以上 重症化リスクを有する 軽症～中等症Ⅰ	12歳以上 軽症～中等症Ⅰ
投与時の 注意点	腎、肝機能障害が あらわれることがある	妊婦、妊娠の可能性の ある女性への処方は禁忌	・腎機能低下患者への 処方は要注意 ・併用禁忌、注意薬多数	・妊婦、妊娠の可能性の ある女性への処方は禁忌 ・併用禁忌、注意薬多数
流通	一般流通	一般流通	一般流通	一般流通
同意書	不要	不要	不要	必要

## ○中和抗体薬

2023年8月4日作成

商品名 (一般名)	ロナプリーブ注射液セット300 (カシリビマブ/イムデビマブ)	ゼビュディ点滴静注液500mg (ソトロビマブ)	エバシールド筋注セット (チキサゲビマブ/シルガビマブ)
用法容量	単回点滴投与	単回点滴投与	単回筋肉内注射
投与対象	12歳以上 重症化リスクを有する 軽症から中等症 I	12歳以上 重症化リスクを有する 軽症から中等症 I	ワクチン接種が推奨されない者、 又は、免疫機能低下等により ワクチン接種で十分な免疫応答が得られない 可能性がある者
投与時の 注意点	中和活性が低いSARS-CoV-2変異株に対しては有効性が期待できない可能性があるため、 最新のガイドライン等を参考に投与の適切性を検討		現在は投与対象者への発症抑制目的に対し てのみ投与可能
流通	・国から無償譲渡される ・「ロナプリーブ登録センター」へ登録が必要	・国から無償譲渡される ・「ゼビュディ登録センター」へ登録が必要	・国から無償譲渡される ・配分を希望する医療機関は、 県への申請が必要
在庫配置	県への申請が必要	県への申請が必要	不可
同意書	不要	不要	不要
参考	「中外製薬ホームページ」 <a href="https://chugai-pharm.jp/doctor/">https://chugai-pharm.jp/doctor/</a>  「ロナプリーブ専用ダイヤル」 0120-002621	「GSKホームページ」 <a href="https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/">https://gskpro.com/ja-jp/products-info/xevudy/</a>  「ゼビュディ登録センター」 0120-126-993	「エバシールド製品サイト」 <a href="https://med.astrazeneca.co.jp/hcp_confirmation.html?resource=/content/PhysicianServices/Japan/048-MediChannel/ja/jp/evu.html">https://med.astrazeneca.co.jp/hcp_confirmation.html?resource=/content/PhysicianServices/Japan/048-MediChannel/ja/jp/evu.html</a>