



娘さんを持つ保護者の方へ 子宮けいがんはワクチン接種と検診で 撲滅できるがんです

HPVワクチンの積極的接種勧奨が再開

2021年11月、厚生労働省はHPVワクチンの積極的接種勧奨を再スタートすることを決定しました。現在定期接種（無料）のHPVワクチンはサーバリックス®（2価）、ガーダシル®（4価）、シルガード9®（9価）の3種類で、国内外の研究結果から、改めてワクチンの安全性や、接種による子宮けいがんの予防効果などのメリットが副反応などのデメリットよりも上回ることを確認して、皆さんに接種をお勧めしています。特に、セクシャルデビュー前にワクチン接種することで、子宮けいがんの原因の2価・4価ワクチンは50～70%、9価ワクチンは80～90%を占めるウイルスへの感染を、ほぼ100%予防することができます。


なお、ワクチン接種後に広範囲に広がる痛みや手足の動かしにくさなどの症状が起きたとの報告がありましたが、これはワクチン接種とは関係なく思春期の女の子に一定数見られる症状であることが最近の研究で明らかとなっています。

保護者だけでなくお子さま自身にもワクチンの効果とリスクについて理解を深めていただき、接種をご検討ください。

世界の動き

2020年11月、WHO（世界保健機関）は、2030年までに15歳以下の女子のHPVワクチン接種率を90%まで高めることを盛り込んだ目標を設定しています。世界では、110カ国で公的な予防接種が行われており、2019年のカナダ、イギリス、オーストラリアの接種率は80%を超えていました。

日本では、子宮けいがんの罹患率・死亡率が先進国で最も高い水準となっている一方で、オーストラリアではワクチン接種と検診を組み合わせることにより、2028年には世界に先駆けて新規の子宮けいがん患者がほぼなくなるとのシミュレーションがなされています。



出典：①WHO/UNICEF Joint Reporting Form on immunization (JRF)
②厚生労働省 定期の予防接種実施者数



伊原木知事からのメッセージ

子宮けいがんは予防できるがんです。しかしながら、日本では子宮けいがん対策の遅れにより、女性のかけがえのない命と健康が今なおリスクにさらされており、私は大きな危機感を覚えています。

皆様に子宮けいがん予防の正しい情報がしっかりと行き届き、子どもたちが幸せな未来を描き将来の夢や希望が実現できることを願っております。

岡山県知事 伊原木 隆太

お問い合わせ

岡山県
疾病感染症対策課 ▶HPVワクチンに関すること 感染症対策班 TEL (086) 226-7331
▶がん検診に関すること 疾病対策班 TEL (086) 226-7321

子宮けいがんに関する情報は下記ホームページをご覧ください

岡山県
「子宮けいがんの予防について」
YouTubeアニメ動画も公開中！



厚生労働省
「ヒトパピローマウイルス感染症～子宮けいがんとHPVワクチン～」



岡山県

▶作成：岡山県保健医療部疾病感染症対策課
▶監修：岡山県産婦人科医会、岡山県小児科医会

令和6(2024)年6月発行

子宮けいがんって なんなん!?



小6から
無料
詳細は中面で！

20歳から
1～2年に
1回



幸せな未来のために!
みんなで取り組む
子宮けいがん予防啓発事業



ももことキビトが
子宮けいがん予防について
分かりやすく解説するんじゅ！

岡山県


子宮けいがんって、なんなん!?

子宮けいがんは、毎年多くの若い女性から「いのち」と「未来」を奪っています。

がんなんて
自分にはまだ
関係ないと
思つるじゃろ?



おかやまVTuber
ももこ



20代・30代のあなたは何をしていますか?仕事、恋愛、結婚、出産、育児…あなたの未来にはたくさん選択肢があります。

一生のうち子宮けいがんになる人
女子76人のうち1人 ※2

子宮けいがんで命を落とす人
女子300人のうち1人 ※3


#01 子宮けいがんってどんな病気なん?

子宮けいがんは、子宮の入口付近にでき、ほとんど自覚症状がなく、症状が出た時にはかなり進行していることもあります。

▶ 症 状 生理に関係ない出血、悪臭を伴う茶色のおりもの、下腹部や腰の痛みなど

▶ 治 療 早期に発見されれば、子宮を残すことも可能ですが、手術では子宮の一部を切り取るため、不妊症になったり、妊娠した時に流早産のリスクが高まる可能性があります。

もっと進行すると、子宮を広範囲に取る手術や放射線治療が必要となり、手術の後遺症(おしつこが出にくく、足がむくむ等)に苦しんだり、場合によっては、命を落とすことがあります。




#02 子宮けいがんの原因ってなんなん?

主な原因是、HPV(ヒトパピローマウイルス)への感染です。HPVはとてもありふれたウイルスで、一度でも性的接觸があれば男女を問わず誰でも感染する可能性があります。

通常は感染しても自然に消えますが、一部は数年から十数年かけて子宮けいがんになってしまうことがあります。

#03 子宮けいがんの予防方法ってなに?

ワクチン(一次予防)と検診(二次予防)の両輪で予防することができます。



子宮けいがんの進行

予防って、どうするん!?

HPVワクチンの接種

なにがええん?

現在定期接種(無料)のHPVワクチンを接種すると、子宮けいがんの原因の2価・4価ワクチンは50~70%、9価ワクチンは80~90%を占めるウイルスへの感染を予防することができます。

性的接觸で感染するため、セクシャルディ

ビュー前に接種することが最も効果的です。

また、年齢が若いほど免疫反応が良いので、希望する場合はなるべく早めに接種しましょう。



おかやまVTuber
キビト

注射は痛いんじゅろ?

筋肉注射なので、直後は、注射した部分の痛みや腫れ、赤みなどの症状が起こることがあります。まれに、重いアレルギー症状や神経系の症状が起こることがあります。

HPVワクチンだけでなく、どんな予防接種にも副反応リスクはあります。注射への恐怖や不安が少しもある人は、無理をしないでお医者さんや周りの大人に相談しましょう。

接種はどうしたらええん?

HPVワクチンは予防接種法に基づく定期接種で、対象者は公費(無料)で接種することができます。

16歳未満の人は保護者の同意が必要ですので、まずは保護者に相談してみましょう。

接種することが決まったら、予約が必要ですでの、接種場所などをお住まいの市町村のホームページ等で確認しましょう。

HPVワクチン定期接種


▶ 対象者	▶ 無料!
①小学校6年生から高校1年生相当の女子	
②高校2年生相当から平成9年度生まれの女子 (令和7年3月までの特例措置)	
※上記①②以外は有料(3回接種で約4~9万円)	
▶ ワクチン	
2価ワクチン(サーバリックス®)	
4価ワクチン(オーダシル®)	
9価ワクチン(シルガード9®)のいずれか	



市町村予防接種担当窓口

接種スケジュール

いずれも、1年内に接種を終えることが望ましい。



接種後症状がでたら、どこに相談したらええん?

予防接種後に気になる症状が現れたら、すぐに接種をした医療機関やかかりつけのお医者さんに相談しましょう。さらに、次の窓口にも相談できます。

不安や疑問、困ったことがあるとき

岡山県保健医療部疾病感染症対策課 TEL (086) 226-7331
岡山県教育庁保健体育課 TEL (086) 226-7591

予防接種による健康被害の相談

お住まいの市町村の予防接種相談窓口にお問合せください。

接種後に生じた症状に関する診療の相談(お医者さんを通じて相談します)

岡山大学病院産婦人科 TEL (086) 223-7151 (代表)
川崎医科大学附属病院産婦人科 TEL (086) 462-1111 (内線23630)

子宮けいがん検診

なぜ必要なん?

ワクチンでは感染を予防できない型のウイルスもあります。自覚症状がなく気づきにくい病気ですので、必ず20歳から1~2年に1回検診を受けて、がんを早期に発見し治療しましょう。

どんなことするん?

一般的な検診では、子宮けい部の細胞を採取して異常の有無を調べる5分程度の簡単な検査です。検診で見つかりにくい種類のがんも増えていますので、ワクチンによる予防も大切です。

検診はどうしたらええん?

子宮けいがんの定期検診は、①職場(お勤め先で受診できる場合)、②市町村(お勤め先で受診できない場合)で実施していますので確認しましょう。

また、産婦人科に相談してみるのも良いでしょう。

