

岡山県感染症週報 2024 年第 33 週 (8 月 12 日 ~ 8 月 18 日)

新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止に向けた知事メッセージ (2024 年 8 月 9 日)

これからお盆を迎え、帰省や旅行など、人と接する機会が増えます。
今年の夏も「うつらない」、「うつさない」行動を心がけましょう。
詳細は[岡山県ホームページ（疾病感染症対策課）](#)を参照ください。

岡山県は『腸管出血性大腸菌感染症注意報』を発令中です

◆2024 年 第 33 週 (8 / 12 ~ 8 / 18) の感染症発生動向 (届出数)

■全数把握感染症の発生状況

- 第 31 週 5 類感染症 梅毒 1 名 (20 代 女)
- 第 32 週 2 類感染症 結核 1 名 (30 代 女)
- 5 類感染症 ウイルス性肝炎 1 名 (30 代 男)
- 第 33 週 2 類感染症 結核 3 名 (70 代 男 1 名、80 代 女 1 名、90 代 女 1 名)
- 3 類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 4 名 (O157: 幼児 男 1 名、
30 代 男 1 名、40 代 男 1 名、50 代 女 1 名)
- 4 類感染症 レジオネラ症 2 名 (70 代 男 1 名、80 代 男 1 名)
- 5 類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1 名 (50 代 男)

食中毒注意報
発令中!



■定点把握感染症の発生状況

患者報告医療機関数: インフルエンザ/COVID-19 定点 84、小児科定点 54、眼科定点 12、STD 定点 17、基幹定点 5

- 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は、県全体で 730 名 (定点あたり 8.69 人) の報告がありました。
- A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告が、過去 10 年間の同時期の平均と比較して多くなっています (定点あたり 1.04 人)。

1. [新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\)](#) は、県全体で 730 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 10.86 → 8.69 人)。詳しくは、「[★新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報](#)」および岡山県感染症情報センターホームページ「[新型コロナウイルス感染症 \(COVID-19\) 情報](#)」をご覧ください。
2. [A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎](#) は、県全体で 56 名の報告があり、前週から減少しました (定点あたり 1.17 → 1.04 人)。地域別では、倉敷市 (1.91 人)、岡山市 (1.43 人) の順で定点あたり報告数が多くなっています。県内の発生状況など詳しくは、「[今週の注目感染症](#)」をご覧ください。

流行の推移 (新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) は別掲載)

疾病名	定点あたり患者数		推移	疾病名	定点あたり患者数		推移
	前週	今週			前週	今週	
インフルエンザ	0.63	0.20	↓	ヘルパンギーナ	0.54	0.30	↓
RSウイルス感染症	2.26	1.13	↓	流行性耳下腺炎	0.06	0.06	→
咽頭結膜熱	0.26	0.17	↓	急性出血性結膜炎	0.00	0.00	→
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.17	1.04	↓	流行性角結膜炎	0.00	0.33	↑
感染性胃腸炎	2.63	2.20	↓	細菌性髄膜炎	0.00	0.00	→
水痘	0.07	0.09	↑	無菌性髄膜炎	0.40	0.20	↓
手足口病	6.70	2.31	↓	マイコプラズマ肺炎	1.20	0.40	↓
伝染性紅斑	0.06	0.06	→	クラミジア肺炎	0.00	0.00	→
突発性発しん	0.19	0.22	↑	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.00	0.00	→

【記号の説明】 前週からの推移

↑: 増加

→: ほぼ増減なし

↓: 減少

増加・減少: 前週比10%以上の増減

◆◆◆ 食中毒予防の 3 原則 ◆◆◆

岡山県は腸管出血性大腸菌感染症注意報を発令中です！

➤ 「清潔」（菌をつけない）


- ・調理前、食事前、トイレ後には、石けんと流水で手をよく洗いましょう。
- ・まな板、ふきん等の調理器具は、十分に洗浄・消毒を行いましょう。
- ・焼肉をする時は、生の肉をつかむはしと食べるはしを使い分けましょう。

➤ 「迅速・冷却」（菌を増やさない）

- ・生鮮食品や調理後の食品は、できるだけ早く食べましょう。
- ・生鮮食品や調理後の食品は、10℃以下で保存しましょう。
（生食用鮮魚介類は、4℃以下で保存するよう努めましょう。）

➤ 「加熱」（菌をやっつける）

- ・加熱して食べる食品は、中心部まで十分に火を通しましょう。
- ・特に、食肉は中心部の色が完全に変わるまで十分に火を通し、生食は避けましょう（腸管出血性大腸菌は、75℃、1 分間以上の加熱で死滅します）。



0157 の電子顕微鏡画像
（国立感染症研究所）

[食中毒予防の 3 原則（岡山県生活衛生課）](#)


[家庭でできる食中毒予防の 6 つのポイント（厚生労働省）](#)

[家庭でできる食中毒予防の 6 つのポイント（厚生労働省作成チラシ）](#)

☆新型コロナウイルス感染症（COVID-19）情報

岡山県の流行状況（第33週（8/12～8/18））

○新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で730名（定点あたり8.69人）の報告がありました（84定点医療機関報告）。



※ 2023年は定点把握対象へ移行した第19週から表示しています。

※ 全数把握時のデータは[こちら](#)

※ 2023年5月7日（2023年第18週）までの全数把握の患者数をもとに、2023年5月8日以降の定点医療機関からの報告患者数を抽出して集計した患者数の推移（参考値）はこちらをご覧ください。→ [厚生労働省 HP](#)

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、県全体で730名の報告があり、前週から減少しました（定点あたり10.86→8.69人）。地域別では、備中地域（15.25人）、倉敷市（12.56人）、美作地域（11.80人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。年代別では、70代を除く年代で前週から減少しました。

基本的な感染防止策（効果的な場面でのマスク着用、手洗い等の手指衛生、換気、3密（密閉・密集・密接）の回避、健康的な日常生活、体調不良時の備え）に留意し、自主的な判断により実施しましょう。

●新型コロナウイルス感染症（COVID-19）とは

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、世界中で流行が継続している呼吸器症状などを呈する感染症です。咳やくしゃみ、会話などの際に排出される、ウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル（飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子）を吸入することで感染すると考えられます。通常は感染者に近い距離（1m以内）で感染しますが、エアロゾルは1mを超えて空气中に留まりうることから、換気が不十分な環境では、感染が拡大するリスクがあります。

●症状

日本で流行の主流となっているオミクロン株は、潜伏期間が2～3日と短く、また、発症前からウイルスを排出し、感染源となることが分かっています。上気道で増殖しやすい特性から、従来株（デルタ株等）に比べ、鼻汁・頭痛・倦怠感・咽頭痛などの風邪様症状の頻度が増加している一方で、嗅覚・味覚障害の頻度の減少が報告されています。しかしながら、肺炎が進展し、重症化する例も少なからず認められます。特に高齢者や基礎疾患（慢性閉塞性肺疾患（COPD）、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、肥満など）のある方がり患すると、重症化する割合が高い傾向にあるとされており、注意が必要です。また、妊婦では妊娠後期に感染すると、早産率が高まり、患者本人も一部は重症化することが報告されています。（[新型コロナウイルスに関する Q&A（一般の方向け）（厚生労働省）](#)）。

●ワクチン接種について

ワクチンは新型コロナウイルス感染症にかかった場合に重症化を予防する効果があるとされています。ワクチンの全額公費による接種は終了しましたが、令和6年度の秋冬に、次の方を対象にお住まいの市町村による定期接種が始まります。

- ・65歳以上の方
 - ・60～64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
- 詳しくは以下をご覧ください。

- ・[新型コロナワクチンについて（厚生労働省）](#)
- ・[新型コロナワクチンについて（岡山県疾病感染症対策課）](#)

なお、罹患後症状（いわゆる後遺症）については、以下をご覧ください。

- ・[罹患後症状のマネジメント・第3.0版（2023年10月20日発行）](#)
- ・[『新型コロナウイルス感染症罹患後も続く症状（後遺症）にお悩みの方へ』（岡山県ホームページ）](#)



© 岡山県「ももっち」

基本的な感染症対策！









1. 地域別発生状況

地域名	発生状況（人）		推移	地域名	発生状況（人）		推移
岡山県全体	患者数	730		備 中	患者数	183	
	定点あたり	8.69			定点あたり	15.25	
岡山市	患者数	53		備 北	患者数	54	
	定点あたり	2.41			定点あたり	9.00	
倉敷市	患者数	201		真 庭	患者数	30	
	定点あたり	12.56			定点あたり	10.00	
備 前	患者数	91		美 作	患者数	118	
	定点あたり	6.07			定点あたり	11.80	

【記号の説明】前週からの推移 ：大幅な増加 ：増加 ：ほぼ増減なし ：減少 ：大幅な減少

大幅：前週比 100%以上の増減

増加・減少：前週比 10～100%未満の増減



※前年データは破線で示しています。

○全国の発生状況

全国集計 2024 年第 33 週速報値（2024 年 8 月 21 日時点）によると、全国の定点あたり報告数は 8.50 人となり、前週から減少しました。


[新型コロナウイルス感染症の国内発生状況等について（厚生労働省）](#)

2. 年齢別発生状況

○第33週（単位：名）

合計	0-3歳	4-6歳	7-9歳	10-14歳	15-19歳	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上
730	56	15	15	31	26	67	66	72	93	75	125	89

○年齢階級別の定点あたり報告数の推移



※前年データは破線で示しています。

⚠ 留意点：年齢階級別の報告数の考え方について

定点医療機関は、小児科定点が内科定点に比べて多く選択されているため、**報告数は小児に偏ります。**一方で、年齢階級別の報告数により、**経時的な流行全体の傾向（トレンド）と水準（レベル）の把握および年齢階級ごとにおける流行の傾向と水準を把握することができます。**

3. 新型コロナウイルス検出状況（ゲノム解析）

ゲノム解析の状況は以下のホームページをご覧ください。

○岡山県の状況

→ [新型コロナウイルスのゲノム解析（岡山県感染症情報センター）](#)

○全国の状況

→ [SARS-CoV-2 変異株について（国立感染症研究所）](#)

4. 入院状況

【入院基幹定点サーベイランス】

基幹定点医療機関（岡山県の基幹定点数：5）から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）による入院患者数等の報告（週単位）を受けて、入院患者の発生動向や重症化の傾向を経時的に把握することを目的としています。2023 年 9 月 25 日（第 39 週）から開始しました（インフルエンザについても同様のサーベイランスが既に行われています。）。


○入院基幹定点サーベイランス（県内基幹定点 5 医療機関による報告）

【第 33 週 入院患者報告数】

年齢	1歳未満	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上	計＊
入院患者数	3	1		1	1			1	1	2	19	23	52
ICU入室＊												1	1
人工呼吸器の利用＊												2	2
いずれにも該当せず	3	1		1	1			1	1	2	19	21	50

＊重複あり

【入院患者数（年代別）の推移】



今週の注目感染症

☆A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎

●A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは


A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、就学前から学童期の小児に多い感染症です。A 群レンサ球菌による呼吸器感染症で、主な感染経路はヒトからヒトへの飛沫感染や接触感染です。そのため、家庭や、学校・保育施設などでの感染も多いとされています。

潜伏期は 2～5 日で、突然の発熱と全身倦怠感、咽頭痛によって発症し、しばしばおう吐を伴います。咽頭炎、扁桃炎のほか、口腔内に点状出血あるいは莓舌がみられることがあります。通常、3～5 日以内に解熱し、主症状は 1 週間以内に消失する予後良好の疾患ですが、点状紅斑様、日焼け様の皮しんが出現する猩紅熱と言われる全身症状を示すことがあります。その他、合併症として、肺炎、髄膜炎、敗血症などの化膿性疾患、あるいはリウマチ熱や急性糸球体腎炎を起こすこともあります。




●発生状況

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の報告数は 2023 年（昨年）の 10 月以降、例年より多い傾向が続いています。全国の第 32 週（8/5～8/11）の発生状況は、定点あたり報告数が 1.84 人であり、前週（2.03 人）とほぼ同数でしたが、過去 5 年間の同時期と比較して多くなっています。都道府県別では鳥取県（5.79 人）、宮崎県（3.97 人）、大分県（3.22 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。

岡山県においても昨年 10 月以降、定点あたり報告数が例年より多い傾向が続いています。第 33 週（8/12～8/18）は県全体で 56 名の報告があり、前週から減少しましたが（定点あたり 1.17 → 1.04 人）、過去 10 年の同時期の平均と比較して多くなっています。地域別では、倉敷市（1.91 人）、岡山市（1.43 人）の順で定点あたり報告数が多くなっています。



2024年 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 発生状況



●治療・予防方法

治療にはペニシリン系抗菌薬が第一選択薬とされていますが、ペニシリンアレルギーがある場合はマクロライド系やセフェム系の抗菌薬が投与されます。

予防としては、患者との濃厚接触を避けることが最も重要であり、うがい、手洗いの実施や、咳エチケットなどの一般的な感染防止策が効果的とされています。発熱、咽頭痛などの症状がみられる場合は早めに医療機関を受診しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください⇒[A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎（厚生労働省）](#)

[A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎とは（国立感染症研究所）](#)

【関連情報】

★劇症型溶血性レンサ球菌感染症

劇症型溶血性レンサ球菌感染症は、突発的に発症し、急速に多臓器不全に進行する感染症です。主にA群溶血性レンサ球菌によって引き起こされますが、劇症型へと進行する理由はいまだ不明です。年齢別にみると30代以上の年代で多く発症しています。

全国では第32週に23名が報告され、累計は過去最多となった昨年の年間報告数(949名)を上回る1,333名となっています(2024年8月14日時点)。



岡山県でも2024年は第33週までに25名の報告があり(2024年8月21日時点)、既に過去10年間で最多となった2018年の報告数(14名)を超えています。

この感染症は急速に症状が進行し、24時間以内に多臓器不全に至ることがあります。手指衛生や咳エチケット、怪我をした際の清潔な処置等に努め、発熱、咽頭痛や創部の発赤、腫脹、痛みなどの症状がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

詳しくはこちらをご覧ください

⇒ [劇症型溶血性レンサ球菌感染症\(STSS\) \(厚生労働省\)](#)

[劇症型溶血性レンサ球菌感染症とは \(国立感染症研究所\)](#)



～ ダニの活動が活発になる時期です ～

ダニが媒介する感染症に注意しましょう！

野外にいる吸血性のダニとして、マダニやツツガムシなどが知られており、これらのダニの中には、**日本紅斑熱、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)※**、**つつが虫病**などを引き起こす病原体を保有しているものがあります。

ダニは、春から秋(3月～11月)にかけて活発に活動します。

野外で作業する際は、肌の露出を少なくし、こまめに虫除け剤(マダニ、ツツガムシの忌避を効能としているもの)を噴霧するなどし、ダニに刺咬されないようにしましょう。

また、野外での作業後は、シャワーや入浴を行い、ダニが付いていないかチェックをしましょう。

※SFTSはSFTSウイルスに感染したイヌやネコからの感染も報告されています。

体調不良のペットや野生動物との接触は避けましょう。

★★ くわしくは、こちらをご覧ください ★★

⇒ [日本紅斑熱とは \(国立感染症研究所\)](#)

⇒ [重症熱性血小板減少症候群\(SFTS\)に関するQ&A \(厚生労働省\)](#)

⇒ [ツツガムシ病とは \(国立感染症研究所\)](#)

⇒ [マダニ対策、今できること \(国立感染症研究所\)](#)



吸血後の
フタゲチマダニ♀



ヤマアラシチマダニ

岡山県環境保健センター
ウイルス科 撮影画像

風しんの抗体検査(無料)を受けましょう！

＜妊娠を希望する女性や同居する家族の方＞

岡山県・岡山市・倉敷市では、先天性風しん症候群（CRS）※の予防を目的として、**風しんの無料抗体検査**を実施しています。

県内の抗体検査実施医療機関において、窓口で費用を負担することなく検査を受けることができます。検査の詳細は、下記のホームページ

岡山市・倉敷市以外 → [風しんの無料抗体検査が受けられます](#)（岡山県疾病感染症対策課）

岡山市 → [風しんの無料抗体検査](#)

倉敷市 → [風しん抗体検査について](#)

をご覧ください。

＜1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日までに生まれた男性＞

風しんの抗体保有率が低い1962年4月2日から1979年4月1日までに生まれた男性に対して、まずは**無料で抗体検査**を受け、**抗体価が低い場合は風しんの予防接種を無料で受けることができる**制度が、実施されています（**2025年3月31日まで**）。

以下の医療機関で、無料の抗体検査が受けられます。

[市町村から届いたクーポン券を使用できる岡山県内の医療機関リスト](#)

※妊娠初期に風しんに罹患すると、出生児に先天性風しん症候群（CRS）と総称される障がいを引き起こすことがあります。先天性心疾患、難聴、白内障が3大症状です。

岡山県の2019年4月～2024年2月の風しんのクーポン使用実績(抗体検査)は、34.5%と未だに低い状況です！

CRSを防ぐためにも、必要な方は確実に予防接種を受けましょう！

[風しんの追加的対策について（厚生労働省）](#)
[風疹に関する疫学情報（国立感染症研究所）](#)
[“風疹ゼロ”プロジェクト（日本産婦人科医会）](#)



© 岡山県「ももっち・うらっち」

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	17	0.20	2	0.09	13	0.81	1	0.07	1	0.08	－	－	－	－	－	－
RSウイルス感染症	61	1.13	8	0.57	24	2.18	1	0.10	5	0.71	2	0.50	8	4.00	13	2.17
咽頭結膜熱	9	0.17	5	0.36	－	－	－	－	－	－	1	0.25	－	－	3	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	56	1.04	20	1.43	21	1.91	4	0.40	6	0.86	－	－	2	1.00	3	0.50
感染性胃腸炎	119	2.20	30	2.14	38	3.45	18	1.80	6	0.86	4	1.00	－	－	23	3.83
水痘	5	0.09	2	0.14	－	－	－	－	3	0.43	－	－	－	－	－	－
手足口病	125	2.31	36	2.57	29	2.64	9	0.90	23	3.29	7	1.75	3	1.50	18	3.00
伝染性紅斑	3	0.06	－	－	1	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	2	0.33
突発性発疹	12	0.22	4	0.29	2	0.18	－	－	1	0.14	－	－	－	－	5	0.83
ヘルパンギーナ	16	0.30	3	0.21	2	0.18	1	0.10	5	0.71	2	0.50	－	－	3	0.50
流行性耳下腺炎	3	0.06	2	0.14	1	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					－	－
流行性角結膜炎	4	0.33	－	－	2	0.50	2	2.00	－	－					－	－
細菌性髄膜炎	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	1	0.20	－	－	1	1.00					－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	2	0.40	2	2.00	－	－					－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－	－	－

疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
インフルエンザ	17	0.20	2	0.09	13	0.81	1	0.07	1	0.08	－	－	－	－	－	－
咽頭結膜熱	9	0.17	5	0.36	－	－	－	－	－	－	1	0.25	－	－	3	0.50
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	56	1.04	20	1.43	21	1.91	4	0.40	6	0.86	－	－	2	1.00	3	0.50
感染性胃腸炎	119	2.20	30	2.14	38	3.45	18	1.80	6	0.86	4	1.00	－	－	23	3.83
水痘	5	0.09	2	0.14	－	－	－	－	3	0.43	－	－	－	－	－	－
手足口病	125	2.31	36	2.57	29	2.64	9	0.90	23	3.29	7	1.75	3	1.50	18	3.00
伝染性紅斑	3	0.06	－	－	1	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	2	0.33
ヘルパンギーナ	16	0.30	3	0.21	2	0.18	1	0.10	5	0.71	2	0.50	－	－	3	0.50
流行性耳下腺炎	3	0.06	2	0.14	1	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					－	－
流行性角結膜炎	4	0.33	－	－	2	0.50	2	2.00	－	－					－	－

濃黄セルに赤字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル3
薄黄セルに黒数字は岡山県地区別感染症マップにおいて、レベル2を示しています。

感染症発生動向調査 週情報 報告患者数 年齢別 (2024年 第33週 2024/08/12～2024/08/18)

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
インフルエンザ	17	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	2	1	-	1	2	4	-	1	1	-

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20～
RSウイルス感染症	61	16	11	21	7	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	9	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	56	-	-	2	4	5	7	6	7	6	6	6	7	-	-
感染性胃腸炎	119	3	10	27	15	7	5	10	9	4	5	4	12	2	6
水痘	5	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
手足口病	125	6	7	36	20	19	10	10	3	4	2	3	3	-	2
伝染性紅斑	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
突発性発疹	12	-	2	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	16	-	3	3	2	3	-	4	-	-	1	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-

疾病名	合計 -6ヶ月-12ヶ月			1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70～
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-

疾病名	合計	0歳	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70～
細菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
マイコプラズマ肺炎	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)

保健所別


疾病名	全県		岡山市		倉敷市		備前		備中		備北		真庭		美作	
	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当	報告数	定点当
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	730	8.69	53	2.41	201	12.56	91	6.07	183	15.25	54	9.00	30	10.00	118	11.80

（ - : 0 or 0.00 ）

年齢別

疾病名	合計	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80～
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	730	8	13	19	11	5	7	5	3	2	8	5	31	26	67	66	72	93	75	125	89

（ - : 0 ）



全数把握 感染症患者発生状況

2024 年 33 週

[illegible]

