


カキ漁場珪藻類計数結果



調査点	10月6日		9月22日(前回)	
	珪藻類	(cells/L)	珪藻類	(cells/L)
2	スケルトネマ属	28,800	コシノディスカス属	8,400
	キートセロス属	24,400	キートセロス属	5,000
	コシノディスカス属	1,600	プレウロシグマ属	400
15	スケルトネマ属	787,000	タラシオネマ	30,000
	キートセロス属	8,900	コシノディスカス属	2,200
	タラシオシラ属	2,000	プレウロシグマ属	300
19 (18)	ユーカンビア属	3,100	スケルトネマ属	311,000
	スケルトネマ属	2,800	シュードニッチア属	60,000
	グイナルディア属	2,600	キートセロス属	49,000
28 (27)	グイナルディア属	1,900		欠測
	プレウロシグマ属	1,100		欠測
	コシノディスカス属	900		欠測
32 (41)		欠測	コシノディスカス属	26,000
		欠測	スケルトネマ属	6,000
		欠測	キートセロス属	5,000
37	スケルトネマ属	11,300	キートセロス属	123,600
	キートセロス属	5,000	スケルトネマ属	8,700
	コシノディスカス属	1,100	グイナルディア属	600

※海水10倍濃縮で検鏡 ※細胞数の多い順に上位3種を記載

【備考】抑制期(4月～9月)と養成期(10月～3月)で次の調査点が変わりました。

・ 18(抑制期) → 19(養成期) ・ 27(抑制期) → 28(養成期)

・ 41(抑制期) → 32(養成期) ※前回(9月22日)データは抑制期の調査点を記載。