

各関係機関長 殿

岡山県病害虫防除所長

病害虫発生予察情報について

病害虫発生予報第4号を下記のとおり発表したので送付します。

令和8年度病害虫発生予報第4号

令和8年6月30日
岡山県

予報概評

作物名	病害虫名	発生時期	発生量
水 稻	葉いもち	—	並
	穂いもち	並	並
	紋枯病	並	やや多
	ヒメトビウンカ	—	並
	縞葉枯病	—	並
	ツマグロヨコバイ	—	並
	ニカメイガ	—	並
	セジロウンカ	—	並
	トビイロウンカ	並	並
カメムシ類	—	並	
モ モ	せん孔細菌病	—	少
	灰星病	—	少
	モモハモグリガ	—	並
	ナシヒメシンクイ	—	少
	ハダニ類	—	やや少
ブドウ	晩腐病	—	やや多
	べと病	—	やや少
	うどんこ病	—	やや多
	フタテンヒメヨコバイ	—	並
	チャノコカクモンハマキ	—	やや多
果樹共通	カメムシ類	—	多
キュウリ	べと病	—	やや少
	うどんこ病	—	並
	褐斑病	—	やや多
	炭疽病	並	やや多
キュウリ・ナス	ミナミキイロアザミウマ	—	並
トマト	疫病	やや遅	並
	葉かび病	—	やや少
(アブラナ科野菜) ダイコン	軟腐病	並	やや多
	キスジノミハムシ	—	並
	コナガ	—	やや少
野菜共通	ハスモンヨトウ	並	並
	アブラムシ類	—	やや少
	モザイク病	—	並
キ ク	白さび病	やや遅	並
	ハダニ類	—	やや多
	アブラムシ類	—	やや少

1. 普通作物

(水 稲)

(1) 葉いもち

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月 22、23 日の巡回調査によると、葉いもちの発生ほ場率は 0.0%で平年 (1.8%) より低かった。

イ. BLASTAM-メッシュ岡山版 (以下、ブラスタム) による葉いもちの感染好適条件が県内で広域に出現したのは、6月 9日、21日である。6月 23日までのブラスタムの結果は下表のとおりである。感染好適条件が出現後、約1週間頃に初発あるいは病斑数の急激な増加が予想される。

ウ. 6月 25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

防除上の参考事項

ア. 補植用の苗は、伝染源となるので処分する。

イ. 箱処理剤を使用していないほ場では、発生を確認後、速やかに防除を行う。箱処理剤を使用しているほ場で発生を確認した場合、箱処理剤と同系統の薬剤の使用を避ける。

ウ. 現時点で未発生のほ場でも、耐病性の弱い品種 (コシヒカリ、あきたこまち、ヒノヒカリ、朝日) は初発後の病勢進展が速いので、早期発見、早期防除に努める。

エ. 本病は、曇雨天日が多い場合に発病が助長されるので今後の気象に注意する。

表 アメダスデータから推測される葉いもちの感染好適条件の出現状況

(BLASTAMメッシュ岡山版)															
地帯区分	北部地帯					中部地帯					南部地帯				
月・日	上長田	千屋	奈義	古町	新見	久世	津山	福渡	和気	高梁	岡山	虫明	倉敷	笠岡	玉野
6.8	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—
9	▲	▲	○	○	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	▲	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	○	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●
21	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
22	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●

● : 感染好適条件 ○及び▲ : 準感染好適条件 — : 感染好適条件は現れなかった

(2) 穂いもち (極早生種対象)

予報内容

発生時期 並
発生量 並

予報の根拠

- ア. 極早生種の生育は概ね平年並である。
- イ. 6月22、23日の巡回調査によると、葉いもちの発生ほ場率は0.0%で平年(1.8%)より低かった。
- ウ. プラスタムによる県中北部における葉いもちの感染好適条件は、6月9日、21日に比較的広域に出現した。6月23日までのプラスタムの結果は前表のとおりである。
- エ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

防除上の参考事項

- ア. 本病は、曇雨天日が多い場合に発病が助長される。

(3) 紋枯病

予報内容

発生時期 並
発生量 **やや多**

予報の根拠

- ア. 6月22、23日の巡回調査では、平年同様発生を認めなかった。
- イ. イネの茎数は概ね平年並で推移している。
- ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(4) ヒメトビウンカと縞葉枯病

予報内容

ヒメトビウンカ (第2世代幼虫)
発生量 並
縞葉枯病
発生量 並

予報の根拠

- ア. 赤磐市の予察灯における6月1～4半旬の誘殺数は4頭で、平年(1.7頭)よりやや多かった。
- イ. 6月22、23日の巡回調査におけるすくい取り調査(20回振り)による発生ほ場率は40.0%で平年(40.7%)並、1地点あたりの成幼虫発生量は1.5頭で平年(2.0頭)よりやや少なかった。
- ウ. 近年の県南部における縞葉枯病の発生は、概ね平年並で推移している。

(5) ツマグロヨコバイ (第2世代幼虫)

予報内容

発生量 並

予報の根拠

- ア. 赤磐市の予察灯における第1世代の初誘殺は5月4半旬で平年(6月1半旬)よりやや早く、6月1～4半旬の飛来数は55頭で、平年(57.1頭)並であった。
- イ. 6月22、23日の巡回調査における見取り・払い落とし調査による発生ほ場率は6.7%で平年(9.6%)よりやや低かった。
- ウ. 6月22、23日の巡回調査におけるすくい取り調査(20回振り)では、1地点あたりの成幼虫の発生量は0.1頭で平年(0.4頭)よりやや少なかった。
- エ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並

か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。
防除上の参考事項

ア. ツマグロヨコバイが媒介する萎縮病は、近年巡回調査において発生を認めていない。

(6) ニカメイガ (第1世代幼虫)

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 赤磐市のフェロモントラップにおいて6月4半旬までに平年同様誘殺を認めていない。

(7) セジロウンカ

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月22、23日の巡回調査における見取り・払い落とし調査での発生ほ場率は20.0%で、平年(13.1%)よりやや高かった。

イ. 6月22、23日の巡回調査におけるすくい取り調査(20回振り)では、1地点あたりの成虫発生量は0.3頭で平年(0.4頭)並であった。

ウ. 赤磐市の予察灯における6月1～4半旬の誘殺数は0頭で、平年(7.0頭)より少なかった。

エ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(8) トビイロウンカ

予報内容

発生時期 並

発生量 並

予報の根拠

ア. 赤磐市及び真庭市の予察灯において平年同様6月4半旬までに飛来を認めていない。

イ. 6月22、23日の巡回調査において発生を認めなかった。

(9) カメムシ類 (アカスジカスミカメ)

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 赤磐市の予察灯における6月1～4半旬の誘殺数は22頭で平年(61.5頭)よりやや少なかった。

イ. 6月22、23日の県北部イネ科牧草地のすくい取り調査(20回振り)では、アカスジカスミカメの発生量は1地点あたり38.7頭で平年(33.6頭)並であった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

防除上の参考事項

ア. イネ科植物の穂は餌であり、産卵場所でもあるため、水田周辺のイネ科植物は除去する。ただし、穂の付いたイネ科植物をイネの出穂2週間前から出穂後3週間の間に除去すると、カメムシを水田に追いやることになるので避ける。

2 果 樹

(モ モ)

(1) せん孔細菌病

予報内容

発生量 少

予報の根拠

ア. 6月18日の巡回調査によると、発生ほ場率は3.6%で平年(34.9%)より低かった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、降水量は平年並か少ないとされており、発生を抑制する条件である。

防除上の参考事項

ア. 次作における伝染源量を減少させるために収穫後の防除を徹底する。

(2) 灰星病

予報内容

発生量 少

予報の根拠

ア. 県予察ほ場における6月24日の幼果の発病果率は2.0%で、平年(8.7%)より低かった。

イ. 4月中旬の巡回調査では花腐れの発生ほ場率は平年より低く、6月18日の巡回調査の幼果での発生は認められなかった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

(3) モモハモグリガ(第3世代幼虫)

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 赤磐市のフェロモントラップにおける6月1～4半旬の誘殺数は0頭で、平年(0.4頭)並であった。

イ. 6月18日の県南部巡回調査では平年同様発生を認めなかった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(4) ナシヒメシンクイ(第3世代幼虫)

予報内容

発生量 少

予報の根拠

ア. 赤磐市のフェロモントラップにおける6月1～4半旬の誘殺数は2頭で、平年(10.6頭)より少なかった。

イ. 6月18日の県南部巡回調査では発生を認めず、新梢被害発生ほ場率は平年(20.5%)より低かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(5) ハダニ類

予報内容

発生量 やや少

予報の根拠

ア. 6月18日の県南部巡回調査における発生ほ場率は17.9%で、平年(34.2%)より低かった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

防除上の参考事項

ア. ハダニ類の発生はシロツメクサ等マメ科の下草が繁茂するほ場で多く、ハダニ類が樹上に移動する除草後の発生状況に注意する。

イ. ハダニ類の発生が多いほ場では、サビダニの発生も多い。

(ブドウ)

(1) 晩腐病

予報内容

発生量 **やや多**

予報の根拠

ア. 6月以降の降水量は平年並～やや多く推移していることから、幼果の感染は平年よりやや多いと考えられる。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

防除上の参考事項

ア. ベノミル剤（ベンレート水和剤）及びアゾキシストロビン剤（アミスター10フロアブル、ストロビードライフロアブル）に対して感受性が低下した菌株が本県各地で確認されている。

(2) ベと病

予報内容

発生量 **やや少**

予報の根拠

ア. 県予察ほ場における初発生の確認日は6月22日で平年よりやや遅かった。

イ. 6月18日の巡回調査によると、発生ほ場率は27.3%で平年（58.2%）より低かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

防除上の参考事項

ア. 梅雨時期の連続降雨により急に病勢が進展する可能性がある。

イ. ブドウベと病に登録のあるストロビルリン系殺菌剤（アゾキシストロビン剤（アミスター10フロアブル）、クレソキシムメチル剤（ストロビードライフロアブル）、ファモキサドン剤（ホライズンドライフロアブルの成分））に対する耐性菌が本県の一部で確認されている。本系統の殺菌剤の使用は1作期1回とし、他系統の殺菌剤と組み合わせて使用する。

(3) うどんこ病

予報内容

発生量 **やや多**

予報の根拠

ア. 6月18日の巡回調査によると、発生ほ場率は18.2%で平年（13.7%）並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(4) フタテンヒメヨコバイ（第2世代幼虫）

予報内容

発生量 **並**

予報の根拠

ア. 6月18日の県南部巡回調査において発生を認めず、平年（0.7%）並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(5) チャノコカクモンハマキ (第2世代幼虫)

予報内容

発生量 **やや多**

予報の根拠

ア. 赤磐市のフェロモントラップにおける6月1～4半旬の誘殺数は15頭で、
平年(7.0頭)よりやや多かった。

イ. 6月18日の県南部巡回調査では平年同様発生を認めなかった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並
か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(果樹共通)

(1) カメムシ類 (チャバネアオカメムシ、ツヤアオカメムシ)

予報内容

発生量 **多**

予報の根拠

ア. 赤磐市の予察灯における4月～6月4半旬のチャバネアオカメムシの誘殺数は
201頭で平年(73.9頭)より多く、ツヤアオカメムシの誘殺数は219頭で平年
(97.3頭)より多かった。

イ. 赤磐市のフェロモントラップにおける4月～6月4半旬のチャバネアオカメ
ムシの誘殺数は、2,328頭で平年(393.7頭)より多かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並
か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

エ. 病害虫発生予察注意報第1号(令和8年5月19日発表)参照。

3. 野菜

(キュウリ)

(1) ベと病

予報内容

発生量 **やや少**

予報の根拠

ア. 県予察ほ場(5月8日定植)において、発病葉率は0.8%で平年(2.8%)並で
あった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると、発生ほ場率は27.3%で平年(35.9%)並
であった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並
か少ないとされており、発生をやや抑制する条件である。

(2) うどんこ病

予報内容

発生量 **並**

予報の根拠

ア. 県予察ほ場(5月8日定植)において、発病葉率は10.1%で平年(4.9%)よ
り高かった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると、発生ほ場率は27.3%で平年(58.7%)よ
り低かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並
か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

(3) 褐斑病

予報内容

発生量 **やや多**

予報の根拠

ア. 県予察ほ場(5月8日定植)において、発病葉率は1.1%で平年(0.7%)並で

あった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると、発生ほ場率は27.3%で平年(19.5%)よりやや高かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(4) 炭疽病

予報内容

発生時期 並

発生量 やや多

予報の根拠

ア. 県予察ほ場(5月8日定植)では発生を認めず、発病葉率は平年(0%)並であった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると、発生ほ場率は27.3%で平年(8.8%)より多かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

(キュウリ、ナス)

(1) ミナミキイロアザミウマ

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査によると、露地ナス及びキュウリでの発生量は平年並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(トマト)

(1) 疫病

予報内容

発生時期 やや遅

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査によると、県南部の促成栽培、露地栽培及び県北部の雨除け栽培では発生を認めず、発生ほ場率は平年(6.8%)並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

(2) 葉かび病

予報内容

発生量 やや少

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査によると、県南部の促成栽培、露地栽培及び県北部の雨除け栽培では発生を認めず、平年(14.1%)より低かった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

防除上の参考事項

ア. 本病の初発生時期(雨除け栽培トマトでは6月下旬～7月上旬)と病勢進展時期(7月下旬～8月上旬)に効果の高い殺菌剤を予防散布する防除体系は、葉かび病の防除に有効である。

イ. 一部地域で Cf-9 を持つ抵抗性品種を侵すレースが確認されているので、発生を認めた場合には速やかに防除対策をとる(平成22年度植物防疫情報第4号参照)。

ウ. 本県では、トマト葉かび病に類似した病徴を示すトマトすすかび病の発生が認められている。肉眼での判別は困難であるが、顕微鏡下で観察すれば、トマトすすかび病菌の分生子が細長い形状であることから葉かび病とは容易に区別できる（平成18年度病害虫発生予察特殊報第2号参照）。

(アブラナ科野菜)

(ダイコン)

(1) 軟腐病

予報内容

発生時期 並

発生量 やや多

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査によると発生を認めず、発生ほ場率は平年（8.2%）並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(2) キスジノミハムシ

予報内容

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(3) コナガ

予報内容

発生量 やや少

予報の根拠

ア. 6月1～4半旬の県予察ほ場（赤磐市）におけるフェロモントラップへの誘殺数は15頭で、平年（26頭）より少なかった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(野菜共通)

(1) ハスモンヨトウ

予報内容

発生時期 並

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月1～4半旬の県予察ほ場（赤磐市）のフェロモントラップの誘殺数は94頭で、平年（110.7頭）並であった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると、ナス、トマト、キュウリでの発生は認められず、発生ほ場率は平年（0%）並であった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(2) アブラムシ類とアブラムシ伝搬性のモザイク病

予報内容

発生量 アブラムシ類 やや少

モザイク病 並

予報の根拠

ア. 6月1～4半旬の県予察ほ場（赤磐市）の黄色水盤への飛来数は156頭で、平年（269.2頭）より少なかった。

イ. 県予察ほ場（赤磐市）における6月下旬のキュウリでのアブラムシ類の発生量は平年並であった。モザイク病は、平年同様発生を認めなかった。

ウ. 6月18、19日の巡回調査では、アブラムシ類の発生量はキュウリ、トマト共に平年並であった。モザイク病の発生は、キュウリ及びトマトで発生を認めず、発生ほ場率は、平年（キュウリ11.2%、10.8%）より低かった。

エ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

防除上の参考事項

ア. モザイク病の発病株は伝染源になるので早めに除去し、アブラムシ類の防除を行う。

4. 花き

(キク)

(1) 白さび病

予報内容

発生時期 やや遅

発生量 並

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査では発生を認めず、発生ほ場率は平年（4.4%）並であった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生を助長する条件ではない。

(2) ハダニ類

予報内容

発生量 **やや多**

予報の根拠

ア. 6月18、19日の巡回調査によると発生ほ場率は33.3%で平年（18.3%）よりやや高かった。

イ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

(3) アブラムシ類

予報内容

発生量 やや少

予報の根拠

ア. 6月1～4半旬の県予察ほ場（赤磐市）の黄色水盤への飛来数は156頭で、平年（269.2頭）より少なかった。

イ. 6月18、19日の巡回調査によると発生ほ場率は0.0%で、平年（10.1%）より低かった。

ウ. 6月25日発表の1か月予報によると、気温は平年より高く、降水量は平年並か少ないとされており、発生をやや助長する条件である。

この情報は、岡山県病害虫防除所ホームページでも公開しています。アドレスは、

<https://www.pref.okayama.jp/soshiki/239/> です。

